５．全国 47 都道府県の生活保護の被保護者割合別にみた主要死因別死亡率および生活習慣要因：1999 年から 2016 年の生態学的パネルデータ分析

研究分担者　西　信雄　（聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科　教授）
研究協力者　北岡かおり（滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター　特任助教）
研究協力者　岡見　雪子（群馬大学食健康科学教育研究センター　講師）
研究協力者　近藤　慶子（滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター　講師（学内））
研究協力者　佐田みずき（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学　講師（非常勤））
研究分担者　門田　文　（滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター　准教授）
研究協力者　中村美詠子（浜松医科大学健康社会医学講座　准教授）
研究分担者　由田　克士（大阪公立大学大学院生活科学研究科食栄養学分野公衆栄養学　教授）
研究分担者　岡村　智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学　教授）
研究分担者　尾島　俊之（浜松医科大学健康社会医学講座　教授）
研究代表者　三浦　克之（滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門　教授）

【目的】

都道府県別の社会経済要因と死亡率および生活習慣要因の推移の関連を包括的に研究することは、公衆衛生的課題に取り組むうえで重要である。

【方法】

全国 47 都道府県を生活保護の被保護者割合をもとに四分位に分けた。死亡率は全死因、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の都道府県別年齢調整死亡率について、2000 年、2005 年、2010 年、2015 年の各年の被保護者割合の四分位別に平均値を求めた。生活習慣要因は国民健康・栄養調査の結果を 1 期（1999-2001 年）、2 期（2003-2005 年）、3 期（2007-2009 年）、4 期（2012 年）、5 期（2016 年）に分け、body mass index (BMI)、総エネルギー・野菜・食塩摂取量、歩数、現在習慣的に喫煙している者の割合、現在飲酒者の割合（2 期以降）について、各年度（1 期から 3 期は中央年）の四分位別に 40 歳から 69 歳の平均値（2010 年の全国の 10 歳階級別人口で調整）を求めた。死亡率と生活習慣要因について、年・期と四分位をもとに二元配置分散分析を行った（$P<0.05$ で有意）。

【結果】

死亡率は男女とも有意に低下し、全死因、悪性新生物、心疾患で男女とも四分位別に有意差を認め、被保護者割合が最も低い第 1 分位の死亡率が低値で推移した。生活習慣要因は男性の BMI が有意に増加した一方、女性の喫煙者割合と飲酒者割合を除く他の生活習慣要因が有意に減少した。男女の BMI、野菜摂取量、食塩摂取量、男性の総エネルギー摂取量、および女性の喫煙者割

合で四分位別に有意差を認め、男女の BMI と女性の喫煙者割合は第 1 分位が概ね低位で、男女の野菜摂取量、食塩摂取量と男性の総エネルギー摂取量は第 1 分位が概ね高位で推移した。

【結論】

死亡率は男女ともに全死因、悪性新生物、心疾患で被保護者割合の四分位別に有意差を認め、生活習慣要因では女性の BMI で、死亡率が低下する方向の推移を示すとともに被保護者割合の四分位別で有意差を認めた。

Prev Med Rep. **2024 Feb 1:39:102635. doi: 10.1016/j.pmedr.2024.102635.**