

表1 ハイリスク新生児調査 栄養に関する項目

- [1] 中心静脈栄養について
 - (1-1) 中心静脈栄養の投与を行っていますか？ [a. はい、b. いいえ]
 - (1-2) 平均的なアミノ酸の投与開始日齢（日齢）
 - (1-3) 平均的なアミノ酸の投与開始量（g/kg/日）
 - (1-4) 平均的な脂肪乳剤の開始日齢（日齢）
 - (1-5) 平均的な脂肪乳剤の投与開始量(g/kg/日)
 - (1-6) 中心静脈栄養終了の目安となる経腸栄養量(mL/kg/日)
- [2] 経腸栄養について
 - (2-1) **初回経腸栄養の開始時期（生後●時間後）**
 - (2-2) 自母乳が届くまでの経腸栄養は何を使用していますか
 - a. 自母乳が届くまではNPO
 - b. ドナーミルク（母乳バンク）
 - c. もらい母乳
 - c. 加水分解乳、成分栄養剤
 - d. 低出生体重児用ミルク
 - e. 普通ミルク
 - f. 糖水
 - (2-3) 母乳強化剤を使用していますか
 - a. HMS-1、HMS-2 を使い分けている
 - b. HMS-1 のみ使用している
 - c. HMS-2 のみ使用している
 - d. 使用していない
 - (2-4) 母乳強化剤を開始する経腸栄養量をお答えください。
 - a. ~20mL/kg/日未満
 - b. 20~50mL/kg/日未満
 - c. 50~100mL/kg/日未満
 - d. 100mL/kg/日 以上
 - (2-5) 母乳強化剤を開始する歳の添加量をお答えください。
 - a. 母乳 120mL に 1包（1/4 強化）
 - b. 母乳 60mL に 1包（1/2 強化）
 - c. 母乳 30mL に 1包（完全強化）