

厚生労働科学研究費補助金【エイズ対策政策研究事業】
HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究
HIV 検査体制の改善に向けた戦略研究（今村顕史）報告書

繁華街の若者における HIV/STI 検査行動に関する研究

◎研究協力者 日高 庸晴（宝塚大学看護学部）
研究協力者 土屋 菜歩（東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
研究分担者 今村 顕史（東京都立駒込病院感染症科）

研究要旨

深夜の繁華街（札幌 [すすきの]、名古屋 [栄]、大阪 [梅田]）に来訪する若者男女を対象に、HIV/STI 知識・意識や過去 6 ヶ月間の性行動、HIV 抗体検査や梅毒検査の生涯受検経験の実態や U=U や PrEP に関する情報の浸透度を明らかにする質問票調査を、各都市に位置する協力の得られたナイトクラブ店頭で実施した。フィールド調査の実施にあたって事前に協力を得たクラブ店舗の店内において、来場者を研究参加にリクルートし、各自のスマートフォンで QR コードを読み込み、無記名自記式質問票調査を Web で回答する仕組みとした（調査実施期間は 2024 年 9 月～2025 年 1 月）。回収数 942 件、有効回答数 922 件（有効回収率 97.9%）であった。平均年齢は 25.28 歳（18-60 歳）であり、恋愛対象の性別は、男性の 90.1%は女性、8.3%が男性、0.7%が男女両方、女性の 79.0%が男性、12.0%が女性、5.7%が男女両方と答えた。主な知見は以下の通りである。

- ・「性感染症にかかっていると HIV に感染しやすい」の正答割合は男性 39.5%、女性 29.9%であった。
- ・「その日のうちに結果が分かる HIV 検査がある」の正答割合は男性 35.2%、女性 24.0%であった。
- ・HIV/STI 知識項目のうち女性だけに尋ねた「HIV 検査では、内診（婦人科や産婦人科での膣の診察）がある」の正答割合は 13.2%であった。男性だけに尋ねた「HIV 検査では、ペニスの診察がある」の正答割合は 24.8%であり、検査手法そのものについて正確な情報が伝達していなかった。
- ・HIV 抗体検査の生涯受検経験は男性 11.6%、女性 10.5%であった。
- ・梅毒検査の生涯受検経験は男性 11.4%、女性 12.3%であった。
- ・過去 6 か月間にセックス経験があった割合は男性 71.4%、女性 67.4%であり、そのうちセックスパートナーの人数が 1 人だけの割合は男性 30.2%、女性 43.6%であった。
- ・過去 6 か月間の膣性交でのコンドーム常時使用割合は男性・女性共に 46.4%であった。
- ・梅毒の生涯既往歴は男性 4.9%、女性 3.0%であった。
- ・U=U と PrEP の浸透割合（聞いたことがある）は回答者全体で 15.2%、13.8%であった。

A. 研究目的

都市部の繁華街に来訪する若年層の性的健康にかかるいわゆる KAP（知識、態度、行動）の現状を把握したのちに、適切かつ効果的な情報提供・健康教育の実施が必要であると考えられる。我々は過年度より継続して大都市の深夜の繁華街に来訪する若者を対象にした行動疫学調査を

実施している。本研究のように、性的に活発な若年層の性行動の実態を詳細に把握する疫学研究や HIV/STI 検査の受検割合などに関する情報を経年的に捕捉する研究はこれまでにわが国になく、当該集団の定点モニタリングとしての継続した横断研究となっている。

本研究の目的は、若年層を対象にした効果的な

HIV 抗体検査や性感染症の検査勧奨に資するために、知識・意識・行動に関する行動疫学調査を行い、実態を明らかにすると共に、フィールド調査実施定点における、セクシュアルヘルスに関連する現状を明確化すると共にその経年変化をモニタリングすることである。

B. 研究方法

札幌 [すすきの]・名古屋 [栄]・大阪 [梅田] の夜の繁華街に位置するナイトクラブそれぞれ 1 店舗から調査協力の承諾を事前に得て、定点観測のための研究フィールドを確保したうえで、横断調査を行った。対象は 18 歳以上の男女とし、調査方法は無記名自記式質問票による行動疫学調査である。実施時期は 2024 年 9 月～2025 年 1 月であり、調査実施のコアタイムは 22 時～深夜 1 時とした。調査実施日の来客者数に応じて前後 30 分程度の短縮や延長するなど臨機応変に対応した。研究参加者のリクルート方法は、調査員がクラブ店舗の店内で来場客に調査参加への声掛けを行い、研究参加に関心を持った者にタブレット端末に発光させて表示した Web 質問票に接続する QR コードを各自のスマートフォンで読み取るよう促し、オンラインアンケートの研究参加を得た（回答所要時間は 5 分程度）。回答終了者には謝品としてクラブ店内で当日使用可能なドリンクチケット（700 円程度）1 枚と希望者にはコンドームを手渡した。

質問票構成内容：基本属性（年齢、性別、恋愛対象となる性別）、クラブ利用目的、HIV/STI 一般知識、HIV 抗体検査・梅毒検査受検歴、過去 6 ヶ月間の性行動（セックス人数、相手の種別、コンドーム使用状況）、STI 既往歴、U=U や PrEP に関する項目、sexting（セクスティング：インターネットや SNS で性的な文章や画像のやり取り）の経験割合を尋ねる質問項目等とした。

（倫理面への配慮）

質問票サイトは Secure Socket Layer (SSL) によって保護され、回答データが暗号化されてサーバーへ送信する仕組みとし、情報漏洩を防ぐ手立てとした。研究参加者をクラブ店頭でリクルート

する際は、研究目的を伝えると共に回答は任意であり自由意思に基づいての参加であることを明示したうえで研究参加を募った。また、質問票サイトにアクセスすると研究目的や質問項目、データの取扱、プライバシー保護、研究実施者等について文字で説明し、同意を得た場合のみ回答画面へ遷移する手続きとした。また、回答途中でも回答を取りやめることが出来る旨を記載し、問い合わせ先の連絡先も画面で示した。研究計画は、宝塚大学看護学部研究倫理委員会による審査および承認を得たうえで、調査を実施した。

C. 研究結果

研究参加者

942 件の回収があり、基本属性が未回答の場合は分析から除外した。その結果、有効回答数は 922 件（有効回収率 97.9%）であった。

男性 588 人、女性 334 人であり平均年齢は 25.3 歳（18-60 歳）であった。最終学歴は大学在学中・卒業が 32.5%（男性 34.7%、女性 28.7%）、大学院在学中・修了が 4.9%（男性 5.3%、女性 4.2%）であった。現在の職業は常勤（正規雇用）が回答者全体の 42.8%（男性 45.9%、女性 37.4%）であり、学生は 18.8%（男性 16.8%、女性 22.2%）であった。恋愛対象は男性の 90.1%が女性、8.3%が男性、男女両方は 0.7%、女性の 79.0%が男性、12.0%が女性、男女両方が 5.7%であった。クラブ利用目的は、音楽を楽しむため（64.9%）、ダンスを楽しむため（29.5%）、お酒を楽しみたいから（27.7%）、友達や仲間と会うため（25.1%）であった。

HIV/STI 知識

「性感染症にかかっていると HIV に感染しやすい」の正答割合は 36.0%（男性 39.5%、女性 29.9%）、「性感染症に感染しても症状が出ないことがある」は 42.4%（男性 44.2%、女性 39.2%）の正答割合であった。「その日のうちに結果がわかる HIV 検査がある」の情報の浸透割合は 31.1%（男性 35.2%、女性 24.0%）、「献血をした人の血液から HIV が見つかった場合、本人に感染が知られると思う」では 16.5%（男性 18.9%、女性

12.3%)であった。「HIVにかかると、すぐに死ぬんじゃないかと思う」は44.8%（男性46.8%、女性41.3%）の正答であった。

女性だけに尋ねた項目である「HIV検査では、内診（婦人科や産婦人科での膣の診察）がある」の正答割合は13.2%であり、過年度調査の結果同様にHIV抗体検査は採血によって行われることが圧倒的に知られておらず、誤解されていることが改めて示された。また、年齢階級別では22歳以下の正答割合は11.6%、23～29歳では14.6%、30歳以上では13.3%であった。男性のみに尋ねた項目として「HIV検査では、ペニスの診察がある」の正答割合は24.8%、年齢階級別では、22歳以下の正答割合は18.0%、23～29歳では26.9%、30歳以上では29.2%であり年齢差はなかった。いずれの項目もクラブ所在地による地域差はなかった。

HIV抗体検査および梅毒検査の生涯受検歴

HIV抗体検査の生涯受検歴は11.2%（男性11.6%、女性10.5%）であった。受検経験者の受検場所は、男性においては保健所や保健センターが最多（58.8%）、病院・診療所・クリニック（35.3%）、女性は病院・診療所・クリニックが最多（51.4%）、保健所や保健センター（40.0%）であり、性別によって受検場所に明確な違いがありこの傾向は過年度の調査結果と同様であった。

梅毒検査の生涯受検歴は11.7%（男性11.4%、女性12.3%）であり、受検場所は、病院・診療所・クリニックが性別にかかわらず最多であった（男性53.7%、女性53.7%）。地域別のHIV/梅毒いずれの生涯受検割合は名古屋が低かった。

過去6か月間の性行動

過去6か月間のセックス経験割合は男性で71.4%（札幌67.5%、名古屋65.4%、大阪75.9%）、女性は67.4%（札幌72.7%、名古屋59.7%、大阪71.8%）であった。過去6か月間のセックスの相手の性別は、男性の91.4%が女性、男性が6.0%、男女両方が1.0%であった。女性の92.4%の相手は男性であり、女性は5.3%、男女両方は1.3%であった。過去6ヶ月間のセックスパートナーの人

数は男性では1人のみが30.2%、2～3人が37.1%、4～9人が17.1%、10人以上が10.5%であった。女性は1人だけが43.6%、2～3人が37.8%、4～9人が7.6%、10人以上が4.0%であった。過去6か月間のセックスパートナーの人数と年齢階級および地域に有意な関連は認められなかった。セックスの相手の種別は男性の場合は恋人・パートナーや配偶者など特定の相手が48.6%と最多であり、次いで友達やセフレが50.7%であった。女性も同様に、恋人・パートナーや配偶者など特定の相手が54.7%、次いで友達やセフレが45.3%であった。街やクラブでナンパした（された）相手は、それぞれ14%、12%であった。

性行動の内訳

過去6ヶ月間にセックス経験があった者のうち、陰性交の経験割合は88.8%（男性90.2%、女性86.2%）であり、年齢階級や地域との関連はなかった。

コンドーム常時使用状況

陰性交におけるコンドーム常時使用割合は、男性・女性共に46.4%であり、コンドームの常時使用割合に地域差はなかった。一方で、男性のみ年齢階級と有意であり、22歳以下の常時使用割合は52.0%であり23～29歳、30歳以上と比して高率であった。

性の安全に関する項目

セクスティング（sexting）と呼ばれる裸体や下着姿の写真をスマートフォン等を介して送信する行為の経験について尋ねた。「送って欲しいと言われた経験」「自らが送った経験」「送って欲しいと言った経験」の3つに分けて尋ねた。「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われた経験は4.7%（男性3.1%、女性7.5%）、自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったことは3.3%（男性2.9%、女性3.9%）、「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」とあなたが誰かに言ったこと2.3%（男性3.1%、女性0.9%）であった。

バー等における酒への睡眠薬など薬物の混入

バーなどで他人のお酒に睡眠薬など薬物を入れた経験について尋ねたところ 6.1% (男性 8.0%、女性 2.7%) にその経験があることが明らかになった。一方で、自分の酒に睡眠薬など薬物を入れた経験は 6.7% (男性 7.8%、女性 4.8%) であり、一定数に加害と被害の経験があった。

ナンパ経験

強引なナンパをされた経験は全体で 57.1% (男性 42.4%、女性 82.9%) であり圧倒的に女性にその経験割合が高率であった。ナンパされた場所の最多はクラブが 22.0% (男性 14.8%、女性 34.7%) であることがわかった。また、強引なナンパを自らした経験は 40.3% (男性 45.9%、女性 30.3%) であった。

マスターベーションに関する質問 (男性のみ)

不適切なマスターベーションによる射精障害などがあるため関連する質問項目を配した。マスターベーションのことについて気軽に相談できる人はいますか？と問うたところ、同性の友人 (41.8%) が最多であり、次いで恋人・配偶者 (8.5%) であったが、回答者の 3 分の 1 以上に相談できる相手がいない (33.5%) 状況であった。HIV/STI 予防啓発や検査受検勧奨の推進にあたって、セクシュアルヘルスに関して安心して相談できることや、その受け皿を整備することが重要であると考えられ、今後の取り組みの必要性が示唆された。

U=U や PrEP に関する項目

U=U について聞いたことがある者は回答者全体で 15.2% (男性 15.8%、女性 14.1%) であった。U=U について聞いたことがある者のうち、「U=U の状態であれば、コンドームを使用しないセックスで HIV に感染する心配はないと思う」と回答した者は 35.7% (男性 40.9%、女性 25.5%) であった。「HIV に感染していない人が、セックスの前に HIV の治療薬を飲むことで HIV を予防すること (PrEP: プレップと呼ぶ) を聞いたことがある」と回答した者は 13.8% (男性 14.6%、女性 12.3%) であった。PrEP について聞いたこと

がある者のうち、「PrEP を信頼している」割合は 55.9% (男性 58.1%、女性 51.2%) であった。

D. 考察

深夜の繁華街に来訪する若年層の性行動調査を継続実施することで、経年変化の把握が可能となっている。調査結果は過年度調査の結果の再現性を確認する内容が多く、HIV/STI の基本的な知識は本調査においても正答割合が低い傾向にあった。また、若年層に梅毒が流行している現況にあるが流行状況について最新の情報や発現する症状にかかる情報が正しく届いているかどうかを今後さらに明らかにすることを試みつつ、感染拡大の流行下であるからこそ、梅毒検査の検査勧奨を行っていくことも重要であろう。その際、HIV 抗体検査についても併せて検査勧奨を行うことがより効果的と思われる。

回答者全体の 70% に過去 6 ヶ月間にセックス経験があり、男性の 64.7%、女性の 49.4% が過去 6 ヶ月間に複数のセックスパートナーを持ち、膣性交におけるコンドーム常時使用割合は半数に満たない状況であった。これらの結果は過年度調査の結果とほぼ同様であった。

セクスティング (sexting) と呼ばれる裸体や下着姿の写真をスマートフォンなどを介して送信する行為は概して低率であった。当該集団は深夜の繁華街に来訪している集団であり、SNS やスマートフォンのみのコミュニケーションではなく直接的な対面の出会いの機会がある。そのため、セクスティングのニーズがなく、経験割合が低くなっている可能性があるのではないだろうか。

酒への睡眠薬など薬物混入の経験について尋ねたところ、自分が入れた・入れられた経験は共に全体で 6% 前後であり、いずれも男性にその経験割合が高かった。また、強引なナンパをされた経験は 57.1% (男性 42.4%、女性 82.9%)、強引なナンパを自らした経験は 40.3% (男性 45.9%、女性 30.3%) であった。これらのことは不同意性交につながる可能性があり、HIV/STI 予防の観点からも、当該集団を対象にした健康教育として積極的な介入が必要な内容であることが示唆され

た。

札幌・名古屋・大阪といった国内でも有数の繁華街に位置するクラブ店舗の協力を得て、本年度も定点観測のための横断調査が実現できた。いずれの店舗の来場者も 20～30 代を中心にした性的活動に活発な若年層である。調査地点として令和 5 年度から名古屋が追加されたが、名古屋の来場者は札幌と大阪に比して男性・女性共に平均年齢が 3～4 歳低いといった、大きな特徴がある。

横断調査を経年的に実施・継続するなかで得られたデータが示すことは、圧倒的に情報や知識の不足がある一方、セクシュアルヘルスの観点からはリスクと隣り合わせの集団であるということである。実際の性行動においても HIV/STI 感染リスクが高いと判断され、それは調査実施年や地域にほぼ違いがない。一連のデータが示す現実は無防備な若年層の存在であり、それは再現性のある結果として何度も調査で示されている。

行動疫学調査を継続実施する傍ら、今後は、知識や情報提供のみならず予防行動の実践とその促進や、セクシュアルヘルス向上とリスク要因の軽減に資するような情報やメッセージを抱き合わせにした健康教育プログラムが必要である。

クラブという空間は日常生活空間とは離れた、都市部の広い密室に大音量の音楽と照明の照度が落とされた異空間である。そこに同世代の大人数が一堂に会している場である。そして、その空

間では、来場者全員が所持しているスマートフォンが調査実施のみならず予防介入を行う際の重要なツールになると考えられる。SNS に極めて親和性が高い世代であり、ショート動画の視聴を頻度高く日常的に行っている年齢層でもある。彼らの日常の生活様式を十分に加味して、HIV/STI 検査勧奨や予防的保健行動の促進に資するための働きかけを効率よく行っていくことが、今後強く期待される。

E. 結論

深夜の都市部繁華街に集う若者の性行動とそれを取り巻く知識や検査受検行動などの実態が明らかになった。

今後も協力を得ている店舗との関係を持続させ、調査定点としてモニタリング調査を継続実施することを通じて、当該集団の動向を引き続き明確化していく必要がある。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

なし

H. 知的所有権の出願・登録状況（予定を含む）

なし

表1. 基本属性(地域別)

		札幌	名古屋	大阪	全体
■年齢平均					
①男性	有効	80	185	323	588
	平均値	27.99	23.71	26.68	25.93
	中央値	25.00	22.00	26.00	25.00
	標準偏差	8.013	4.783	5.517	5.913
	最小値	18	18	18	18
	最大値	60	45	60	60
②女性	有効	33	124	177	334
	平均値	24.36	21.86	25.68	24.13
	中央値	23.00	21.00	25.00	23.00
	標準偏差	6.219	2.883	4.325	4.458
	最小値	18	18	19	18
	最大値	52	36	42	52
①+② 全体	有効	113	309	500	922
	平均値	26.93	22.97	26.33	25.28
	中央値	25.00	22.00	25.00	24.00
	標準偏差	7.687	4.220	5.145	5.496
	最小値	18	18	18	18
	最大値	60	45	60	60

※60歳以上の方は60歳として算出

表12. 基本属性(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■年代										
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588		
	22歳以下	15	(18.8)	99	(53.5)	53	(16.4)	167	(28.4)	<0.001
	23歳～29歳	44	(55.0)	67	(36.2)	197	(61.0)	308	(52.4)	
	30歳以上	21	(26.3)	19	(10.3)	73	(22.6)	113	(19.2)	
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334		
	22歳以下	16	(48.5)	93	(75.0)	37	(20.9)	146	(43.7)	<0.001
	23歳～29歳	14	(42.4)	27	(21.8)	117	(66.1)	158	(47.3)	
	30歳以上	3	(9.1)	4	(3.2)	23	(13.0)	30	(9.0)	
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922		
	22歳以下	31	(27.4)	192	(62.1)	90	(18.0)	313	(33.9)	<0.001
	23歳～29歳	58	(51.3)	94	(30.4)	314	(62.8)	466	(50.5)	
	30歳以上	24	(21.2)	23	(7.4)	96	(19.2)	143	(15.5)	
■最終学歴を教えてください。										
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588		
	中学卒業	2	(2.5)	10	(5.4)	7	(2.2)	19	(3.2)	<0.001
	高校在学中・卒業	17	(21.3)	62	(33.5)	51	(15.8)	130	(22.1)	
	専門学校在学中・卒業	13	(16.3)	14	(7.6)	38	(11.8)	65	(11.1)	
	高専在学中・卒業	2	(2.5)	8	(4.3)	19	(5.9)	29	(4.9)	
	短大在学中・卒業	2	(2.5)	7	(3.8)	8	(2.5)	17	(2.9)	
	大学在学中・卒業	31	(38.8)	55	(29.7)	118	(36.5)	204	(34.7)	
	大学院在学中・修了	7	(8.8)	7	(3.8)	17	(5.3)	31	(5.3)	
	その他	6	(7.5)	18	(9.7)	49	(15.2)	73	(12.4)	
	無回答	–	(0.0)	4	(2.2)	16	(5.0)	20	(3.4)	
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334		
	中学卒業	1	(3.0)	2	(1.6)	3	(1.7)	6	(1.8)	0.250
	高校在学中・卒業	8	(24.2)	35	(28.2)	26	(14.7)	69	(20.7)	
	専門学校在学中・卒業	8	(24.2)	25	(20.2)	30	(16.9)	63	(18.9)	
	高専在学中・卒業	2	(6.1)	6	(4.8)	13	(7.3)	21	(6.3)	
	短大在学中・卒業	3	(9.1)	5	(4.0)	13	(7.3)	21	(6.3)	
	大学在学中・卒業	8	(24.2)	32	(25.8)	56	(31.6)	96	(28.7)	
	大学院在学中・修了	–	(0.0)	2	(1.6)	12	(6.8)	14	(4.2)	
	その他	3	(9.1)	14	(11.3)	22	(12.4)	39	(11.7)	
	無回答	–	(0.0)	3	(2.4)	2	(1.1)	5	(1.5)	
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922		
	中学卒業	3	(2.7)	12	(3.9)	10	(2.0)	25	(2.7)	<0.001
	高校在学中・卒業	25	(22.1)	97	(31.4)	77	(15.4)	199	(21.6)	
	専門学校在学中・卒業	21	(18.6)	39	(12.6)	68	(13.6)	128	(13.9)	
	高専在学中・卒業	4	(3.5)	14	(4.5)	32	(6.4)	50	(5.4)	
	短大在学中・卒業	5	(4.4)	12	(3.9)	21	(4.2)	38	(4.1)	
	大学在学中・卒業	39	(34.5)	87	(28.2)	174	(34.8)	300	(32.5)	
	大学院在学中・修了	7	(6.2)	9	(2.9)	29	(5.8)	45	(4.9)	
	その他	9	(8.0)	32	(10.4)	71	(14.2)	112	(12.1)	
	無回答	–	(0.0)	7	(2.3)	18	(3.6)	25	(2.7)	

表1. 基本属性(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■職業									
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588	
	学生	10	(12.5)	51	(27.6)	38	(11.8)	99	(16.8)
	パート・アルバイト	6	(7.5)	8	(4.3)	20	(6.2)	34	(5.8)
	常勤(正規雇用)	43	(53.8)	76	(41.1)	151	(46.7)	270	(45.9)
	常勤(非正規雇用)	2	(2.5)	9	(4.9)	15	(4.6)	26	(4.4)
	自営業	7	(8.8)	14	(7.6)	34	(10.5)	55	(9.4)
	主婦・主夫	—	(0.0)	—	(0.0)	3	(0.9)	3	(0.5)
	無職	2	(2.5)	6	(3.2)	3	(0.9)	11	(1.9)
	その他	10	(12.5)	17	(9.2)	47	(14.6)	74	(12.6)
	無回答	—	(0.0)	4	(2.2)	12	(3.7)	16	(2.7)
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334	
	学生	9	(27.3)	41	(33.1)	24	(13.6)	74	(22.2)
	パート・アルバイト	5	(15.2)	16	(12.9)	23	(13.0)	44	(13.2)
	常勤(正規雇用)	13	(39.4)	34	(27.4)	78	(44.1)	125	(37.4)
	常勤(非正規雇用)	1	(3.0)	4	(3.2)	6	(3.4)	11	(3.3)
	自営業	2	(6.1)	7	(5.6)	13	(7.3)	22	(6.6)
	主婦・主夫	1	(3.0)	1	(0.8)	7	(4.0)	9	(2.7)
	無職	1	(3.0)	2	(1.6)	2	(1.1)	5	(1.5)
	その他	1	(3.0)	16	(12.9)	22	(12.4)	39	(11.7)
	無回答	—	(0.0)	3	(2.4)	2	(1.1)	5	(1.5)
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922	
	学生	19	(16.8)	92	(29.8)	62	(12.4)	173	(18.8)
	パート・アルバイト	11	(9.7)	24	(7.8)	43	(8.6)	78	(8.5)
	常勤(正規雇用)	56	(49.6)	110	(35.6)	229	(45.8)	395	(42.8)
	常勤(非正規雇用)	3	(2.7)	13	(4.2)	21	(4.2)	37	(4.0)
	自営業	9	(8.0)	21	(6.8)	47	(9.4)	77	(8.4)
	主婦・主夫	1	(0.9)	1	(0.3)	10	(2.0)	12	(1.3)
	無職	3	(2.7)	8	(2.6)	5	(1.0)	16	(1.7)
	その他	11	(9.7)	33	(10.7)	69	(13.8)	113	(12.3)
	無回答	—	(0.0)	7	(2.3)	14	(2.8)	21	(2.3)
■恋愛対象の性別									
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588	
	男性	2	(2.5)	21	(11.4)	26	(8.0)	49	(8.3)
	女性	77	(96.3)	162	(87.6)	291	(90.1)	530	(90.1)
	男女両方	—	(0.0)	1	(0.5)	3	(0.9)	4	(0.7)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ	—	(0.0)	1	(0.5)	3	(0.9)	4	(0.7)
	その他	1	(1.3)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(0.2)
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334	
	男性	25	(75.8)	100	(80.6)	139	(78.5)	264	(79.0)
	女性	5	(15.2)	13	(10.5)	22	(12.4)	40	(12.0)
	男女両方	1	(3.0)	8	(6.5)	10	(5.6)	19	(5.7)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ	1	(3.0)	1	(0.8)	4	(2.3)	6	(1.8)
	その他	1	(3.0)	1	(0.8)	2	(1.1)	4	(1.2)
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922	
	男性	27	(23.9)	121	(39.2)	165	(33.0)	313	(33.9)
	女性	82	(72.6)	175	(56.6)	313	(62.6)	570	(61.8)
	男女両方	1	(0.9)	9	(2.9)	13	(2.6)	23	(2.5)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ	1	(0.9)	2	(0.6)	7	(1.4)	10	(1.1)
	その他	1	(0.9)	1	(0.3)	2	(0.4)	4	(0.4)
①+② 全体	無回答	1	(0.9)	1	(0.3)	—	(0.0)	2	(0.2)

表1. 基本属性(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■クラブ利用目的(複数回答)									
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588	
	音楽を楽しむため	57	(71.3)	120	(64.9)	198	(61.3)	375	(63.8)
	ダンスを楽しむため	18	(22.5)	52	(28.1)	89	(27.6)	159	(27.0)
	友達や仲間と会うため	13	(16.3)	43	(23.2)	67	(20.7)	123	(20.9)
	ナンパするため	14	(17.5)	44	(23.8)	109	(33.7)	167	(28.4)
	ナンパされるため	4	(5.0)	18	(9.7)	26	(8.0)	48	(8.2)
	お酒を楽しみたいから	20	(25.0)	37	(20.0)	72	(22.3)	129	(21.9)
	ストレス解消のため	9	(11.3)	21	(11.4)	48	(14.9)	78	(13.3)
	人恋しいから	6	(7.5)	16	(8.6)	25	(7.7)	47	(8.0)
	その他	1	(1.3)	16	(8.6)	12	(3.7)	29	(4.9)
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334	
	音楽を楽しむため	22	(66.7)	77	(62.1)	124	(70.1)	223	(66.8)
	ダンスを楽しむため	10	(30.3)	43	(34.7)	60	(33.9)	113	(33.8)
	友達や仲間と会うため	9	(27.3)	40	(32.3)	59	(33.3)	108	(32.3)
	ナンパするため	-	(0.0)	3	(2.4)	6	(3.4)	9	(2.7)
	ナンパされるため	1	(3.0)	4	(3.2)	11	(6.2)	16	(4.8)
	お酒を楽しみたいから	16	(48.5)	41	(33.1)	69	(39.0)	126	(37.7)
	ストレス解消のため	7	(21.2)	24	(19.4)	37	(20.9)	68	(20.4)
	人恋しいから	-	(0.0)	6	(4.8)	6	(3.4)	12	(3.6)
	その他	4	(12.1)	8	(6.5)	4	(2.3)	16	(4.8)
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922	
	音楽を楽しむため	79	(69.9)	197	(63.8)	322	(64.4)	598	(64.9)
	ダンスを楽しむため	28	(24.8)	95	(30.7)	149	(29.8)	272	(29.5)
	友達や仲間と会うため	22	(19.5)	83	(26.9)	126	(25.2)	231	(25.1)
	ナンパするため	14	(12.4)	47	(15.2)	115	(23.0)	176	(19.1)
	ナンパされるため	5	(4.4)	22	(7.1)	37	(7.4)	64	(6.9)
	お酒を楽しみたいから	36	(31.9)	78	(25.2)	141	(28.2)	255	(27.7)
	ストレス解消のため	16	(14.2)	45	(14.6)	85	(17.0)	146	(15.8)
	人恋しいから	6	(5.3)	22	(7.1)	31	(6.2)	59	(6.4)
	その他	5	(4.4)	24	(7.8)	16	(3.2)	45	(4.9)

表2. 知識(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ 性感染症にかかっているとHIV(エイズ)に感染しやすい									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う(正)	28	(35.0)	75	(40.5)	129	(39.9)	232	(39.5)
	そう思わない	25	(31.3)	38	(20.5)	96	(29.7)	159	(27.0)
	わからない	27	(33.8)	72	(38.9)	98	(30.3)	197	(33.5)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う(正)	7	(21.2)	33	(26.6)	60	(33.9)	100	(29.9)
	そう思わない	9	(27.3)	23	(18.5)	45	(25.4)	77	(23.1)
	わからない	17	(51.5)	68	(54.8)	72	(40.7)	157	(47.0)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	そう思う(正)	35	(31.0)	108	(35.0)	189	(37.8)	332	(36.0)
	そう思わない	34	(30.1)	61	(19.7)	141	(28.2)	236	(25.6)
	わからない	44	(38.9)	140	(45.3)	170	(34.0)	354	(38.4)
■ 性感染症に感染しても症状が出ないことがある									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う(正)	36	(45.0)	84	(45.4)	140	(43.3)	260	(44.2)
	そう思わない	21	(26.3)	33	(17.8)	77	(23.8)	131	(22.3)
	わからない	23	(28.8)	68	(36.8)	106	(32.8)	197	(33.5)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う(正)	10	(30.3)	41	(33.1)	80	(45.2)	131	(39.2)
	そう思わない	4	(12.1)	14	(11.3)	27	(15.3)	45	(13.5)
	わからない	19	(57.6)	69	(55.6)	70	(39.5)	158	(47.3)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	そう思う(正)	46	(40.7)	125	(40.5)	220	(44.0)	391	(42.4)
	そう思わない	25	(22.1)	47	(15.2)	104	(20.8)	176	(19.1)
	わからない	42	(37.2)	137	(44.3)	176	(35.2)	355	(38.5)
■ その日のうちに結果がわかるHIV(エイズ)検査がある									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う(正)	28	(35.0)	69	(37.3)	110	(34.1)	207	(35.2)
	そう思わない	19	(23.8)	36	(19.5)	77	(23.8)	132	(22.4)
	わからない	33	(41.3)	80	(43.2)	136	(42.1)	249	(42.3)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う(正)	5	(15.2)	28	(22.6)	47	(26.6)	80	(24.0)
	そう思わない	5	(15.2)	16	(12.9)	35	(19.8)	56	(16.8)
	わからない	23	(69.7)	80	(64.5)	95	(53.7)	198	(59.3)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	そう思う(正)	33	(29.2)	97	(31.4)	157	(31.4)	287	(31.1)
	そう思わない	24	(21.2)	52	(16.8)	112	(22.4)	188	(20.4)
	わからない	56	(49.6)	160	(51.8)	231	(46.2)	447	(48.5)
■ HIV(エイズ)にかけると、すぐ死ぬんじゃないかと思う									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う	13	(16.3)	51	(27.6)	73	(22.6)	137	(23.3)
	そう思わない(正)	45	(56.3)	70	(37.8)	160	(49.5)	275	(46.8)
	わからない	22	(27.5)	64	(34.6)	90	(27.9)	176	(29.9)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う	4	(12.1)	21	(16.9)	26	(14.7)	51	(15.3)
	そう思わない(正)	11	(33.3)	46	(37.1)	81	(45.8)	138	(41.3)
	わからない	18	(54.5)	57	(46.0)	70	(39.5)	145	(43.4)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	そう思う	17	(15.0)	72	(23.3)	99	(19.8)	188	(20.4)
	そう思わない(正)	56	(49.6)	116	(37.5)	241	(48.2)	413	(44.8)
	わからない	40	(35.4)	121	(39.2)	160	(32.0)	321	(34.8)

表2. 知識(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ HIV(エイズ)の検査では、内診(婦人科や産婦人科での膣の診察)がある ※女性のみに質問									
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う	11	(33.3)	47	(37.9)	82	(46.3)	140	(41.9)
	そう思わない(正)	4	(12.1)	13	(10.5)	27	(15.3)	44	(13.2)
	わからない	18	(54.5)	64	(51.6)	68	(38.4)	150	(44.9)
■ HIV(エイズ)の検査では、ペニスの診察がある ※男性のみに質問									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う	32	(40.0)	77	(41.6)	124	(38.4)	233	(39.6)
	そう思わない(正)	21	(26.3)	40	(21.6)	85	(26.3)	146	(24.8)
	わからない	27	(33.8)	68	(36.8)	114	(35.3)	209	(35.5)
■ 不適切なマスターベーションの方法によって、セックスの時に射精しづらくなることがある ※男性のみに質問									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う	40	(50.0)	98	(53.0)	176	(54.5)	314	(53.4)
	そう思わない(正)	15	(18.8)	36	(19.5)	60	(18.6)	111	(18.9)
	わからない	25	(31.3)	51	(27.6)	87	(26.9)	163	(27.7)
■ 献血をした人の血液からHIV(エイズウイルス)が見つかった場合、本人に感染が知られると思う									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	そう思う	33	(41.3)	87	(47.0)	157	(48.6)	277	(47.1)
	そう思わない(正)	16	(20.0)	33	(17.8)	62	(19.2)	111	(18.9)
	わからない	31	(38.8)	65	(35.1)	104	(32.2)	200	(34.0)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	そう思う	9	(27.3)	48	(38.7)	79	(44.6)	136	(40.7)
	そう思わない(正)	5	(15.2)	12	(9.7)	24	(13.6)	41	(12.3)
	わからない	19	(57.6)	64	(51.6)	74	(41.8)	157	(47.0)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	そう思う	42	(37.2)	135	(43.7)	236	(47.2)	413	(44.8)
	そう思わない(正)	21	(18.6)	45	(14.6)	86	(17.2)	152	(16.5)
	わからない	50	(44.2)	129	(41.7)	178	(35.6)	357	(38.7)

表3. HIV抗体検査・梅毒検査(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■これまでに、HIV(エイズ)の検査を受けたことがありますか？									
①男性	ある	n=80		n=185		n=323		n=588	
	ない	8	(10.0)	16	(8.6)	44	(13.6)	68	(11.6)
②女性	ある	72	(90.0)	169	(91.4)	279	(86.4)	520	(88.4)
	ない	n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	ある	4	(12.1)	12	(9.7)	19	(10.7)	35	(10.5)
	ない	29	(87.9)	112	(90.3)	158	(89.3)	299	(89.5)
①+② 全体	ある	n=113		n=309		n=500		n=922	
	ない	12	(10.6)	28	(9.1)	63	(12.6)	103	(11.2)
①+② 全体	ある	101	(89.4)	281	(90.9)	437	(87.4)	819	(88.8)
	ない								
■HIV抗体検査を受けた場所(複数回答)									
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがある者を分母とする。									
①男性	保健所や保健センター	n=8		n=16		n=44		n=68	
	病院・診療所・クリニック	6	(75.0)	10	(62.5)	24	(54.5)	40	(58.8)
	郵送検査	2	(25.0)	6	(37.5)	16	(36.4)	24	(35.3)
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(6.8)	3	(4.4)
②女性	保健所や保健センター	n=4		n=12		n=19		n=35	
	病院・診療所・クリニック	1	(25.0)	5	(41.7)	8	(42.1)	14	(40.0)
	郵送検査	3	(75.0)	5	(41.7)	10	(52.6)	18	(51.4)
	その他	-	(0.0)	1	(8.3)	1	(5.3)	2	(5.7)
①+② 全体	保健所や保健センター	n=12		n=28		n=63		n=103	
	病院・診療所・クリニック	7	(58.3)	15	(53.6)	32	(50.8)	54	(52.4)
	郵送検査	5	(41.7)	11	(39.3)	26	(41.3)	42	(40.8)
	その他	-	(0.0)	1	(3.6)	4	(6.3)	5	(4.9)
①+② 全体	保健所や保健センター	-	(0.0)	2	(7.1)	7	(11.1)	9	(8.7)
	病院・診療所・クリニック								
	郵送検査								
	その他								
■これまでに、梅毒の検査を受けたことがありますか？									
①男性	ある	n=80		n=185		n=323		n=588	
	ない	10	(12.5)	13	(7.0)	44	(13.6)	67	(11.4)
②女性	ある	70	(87.5)	172	(93.0)	279	(86.4)	521	(88.6)
	ない	n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	ある	6	(18.2)	9	(7.3)	26	(14.7)	41	(12.3)
	ない	27	(81.8)	115	(92.7)	151	(85.3)	293	(87.7)
①+② 全体	ある	n=113		n=309		n=500		n=922	
	ない	16	(14.2)	22	(7.1)	70	(14.0)	108	(11.7)
①+② 全体	ある	97	(85.8)	287	(92.9)	430	(86.0)	814	(88.3)
	ない								
■梅毒検査を受けた場所(複数回答)									
※これまでに梅毒検査を受けたことがある者を分母とする。									
①男性	保健所や保健センター	n=10		n=13		n=44		n=67	
	病院・診療所・クリニック	5	(50.0)	7	(53.8)	17	(38.6)	29	(43.3)
	郵送検査	5	(50.0)	8	(61.5)	23	(52.3)	36	(53.7)
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(6.8)	3	(4.5)
②女性	保健所や保健センター	n=6		n=9		n=26		n=41	
	病院・診療所・クリニック	1	(16.7)	3	(33.3)	11	(42.3)	15	(36.6)
	郵送検査	4	(66.7)	3	(33.3)	15	(57.7)	22	(53.7)
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(7.7)	2	(4.9)
①+② 全体	保健所や保健センター	n=16		n=22		n=70		n=108	
	病院・診療所・クリニック	6	(37.5)	10	(45.5)	28	(40.0)	44	(40.7)
	郵送検査	9	(56.3)	11	(50.0)	38	(54.3)	58	(53.7)
	その他	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(7.1)	5	(4.6)
①+② 全体	保健所や保健センター	1	(6.3)	2	(9.1)	6	(8.6)	9	(8.3)
	病院・診療所・クリニック								
	郵送検査								
	その他								
■これまでに、献血したことはありますか？									
①男性	ある	n=80		n=185		n=323		n=588	
	ない	45	(56.3)	63	(34.1)	129	(39.9)	237	(40.3)
②女性	ある	35	(43.8)	122	(65.9)	191	(59.1)	348	(59.2)
	ない	n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	ある	12	(36.4)	28	(22.6)	53	(29.9)	93	(27.8)
	ない	20	(60.6)	90	(72.6)	123	(69.5)	233	(69.8)
①+② 全体	ある	1	(3.0)	6	(4.8)	1	(0.6)	8	(2.4)
	ない	n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	ある	57	(50.4)	91	(29.4)	182	(36.4)	330	(35.8)
	ない	55	(48.7)	212	(68.6)	314	(62.8)	581	(63.0)
①+② 全体	ある	1	(0.9)	6	(1.9)	4	(0.8)	11	(1.2)
	ない								

表4. 性交経験(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間のセックス経験									
①男性	した	n=80		n=185		n=323		n=588	
	していない	54 (67.5)		121 (65.4)		245 (75.9)		420 (71.4)	0.030
②女性	した	n=33		n=124		n=177		n=334	
	していない	26 (32.5)		64 (34.6)		78 (24.1)		168 (28.6)	
①+② 全体	した	n=113		n=309		n=500		n=922	
	していない	78 (69.0)		195 (63.1)		372 (74.4)		645 (70.0)	0.003
※過去6か月間にあなたがセックスした相手の性別(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性	男性	n=54		n=121		n=245		n=420	
	女性	1 (1.9)		8 (6.6)		16 (6.5)		25 (6.0)	0.589
	男女両方	53 (98.1)		108 (89.3)		223 (91.0)		384 (91.4)	
	その他	- (0.0)		2 (1.7)		2 (0.8)		4 (1.0)	
②女性	男性	n=24		n=74		n=127		n=225	
	女性	20 (83.3)		68 (91.9)		120 (94.5)		208 (92.4)	0.219
	男女両方	3 (12.5)		4 (5.4)		5 (3.9)		12 (5.3)	
	その他	- (0.0)		2 (2.7)		1 (0.8)		3 (1.3)	
①+② 全体	男性	n=78		n=195		n=372		n=645	
	女性	21 (26.9)		76 (39.0)		136 (36.6)		233 (36.1)	0.322
	男女両方	56 (71.8)		112 (57.4)		228 (61.3)		396 (61.4)	
	その他	- (0.0)		4 (2.1)		3 (0.8)		7 (1.1)	
■過去6か月間にセックスした相手の人数									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性	1人のみ	n=54		n=121		n=245		n=420	
	2～3人	20 (37.0)		39 (32.2)		68 (27.8)		127 (30.2)	0.194
	4～9人	26 (48.1)		39 (32.2)		91 (37.1)		156 (37.1)	
	10人以上	3 (5.6)		21 (17.4)		48 (19.6)		72 (17.1)	
	答えたくない	3 (5.6)		15 (12.4)		26 (10.6)		44 (10.5)	
②女性	1人のみ	n=24		n=74		n=127		n=225	
	2～3人	2 (3.7)		7 (5.8)		12 (4.9)		21 (5.0)	
	4～9人	8 (33.3)		31 (41.9)		59 (46.5)		98 (43.6)	0.480
	10人以上	9 (37.5)		29 (39.2)		47 (37.0)		85 (37.8)	
	答えたくない	1 (4.2)		8 (10.8)		8 (6.3)		17 (7.6)	
①+② 全体	1人のみ	n=78		n=195		n=372		n=645	
	2～3人	28 (35.9)		70 (35.9)		127 (34.1)		225 (34.9)	0.487
	4～9人	35 (44.9)		68 (34.9)		138 (37.1)		241 (37.4)	
	10人以上	4 (5.1)		29 (14.9)		56 (15.1)		89 (13.8)	
	答えたくない	5 (6.4)		17 (8.7)		31 (8.3)		53 (8.2)	
		6 (7.7)		11 (5.6)		20 (5.4)		37 (5.7)	

表4. 性交経験(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間にあなたがセックスした相手の種別(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=54		n=121		n=245		n=420	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	33	(61.1)	50	(41.3)	121	(49.4)	204	(48.6)
	友達やセフレと	27	(50.0)	64	(52.9)	122	(49.8)	213	(50.7)
	(自分が)お金を払った相手と	2	(3.7)	5	(4.1)	15	(6.1)	22	(5.2)
	(自分に)お金をくれた相手と	1	(1.9)	3	(2.5)	3	(1.2)	7	(1.7)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と								
	街やクラブでナンパした(された)相手と	1	(1.9)	5	(4.1)	15	(6.1)	21	(5.0)
	その他	1	(1.9)	26	(21.5)	32	(13.1)	59	(14.0)
		1	(1.9)	4	(3.3)	9	(3.7)	14	(3.3)
②女性		n=24		n=74		n=127		n=225	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	14	(58.3)	38	(51.4)	71	(55.9)	123	(54.7)
	友達やセフレと	11	(45.8)	34	(45.9)	57	(44.9)	102	(45.3)
	(自分が)お金を払った相手と	1	(4.2)	3	(4.1)	2	(1.6)	6	(2.7)
	(自分に)お金をくれた相手と	1	(4.2)	1	(1.4)	5	(3.9)	7	(3.1)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と								
	街やクラブでナンパした(された)相手と	-	(0.0)	1	(1.4)	6	(4.7)	7	(3.1)
	その他	4	(16.7)	11	(14.9)	12	(9.4)	27	(12.0)
		2	(8.3)	3	(4.1)	6	(4.7)	11	(4.9)
①+② 全体		n=78		n=195		n=372		n=645	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	47	(60.3)	88	(45.1)	192	(51.6)	327	(50.7)
	友達やセフレと	38	(48.7)	98	(50.3)	179	(48.1)	315	(48.8)
	(自分が)お金を払った相手と	3	(3.8)	8	(4.1)	17	(4.6)	28	(4.3)
	(自分に)お金をくれた相手と	2	(2.6)	4	(2.1)	8	(2.2)	14	(2.2)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と								
	街やクラブでナンパした(された)相手と	1	(1.3)	6	(3.1)	21	(5.6)	28	(4.3)
	その他	5	(6.4)	37	(19.0)	44	(11.8)	86	(13.3)
		3	(3.8)	7	(3.6)	15	(4.0)	25	(3.9)
■過去6か月間のセックス相手の国籍(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=54		n=121		n=245		n=420	
	日本人	54	(100.0)	112	(92.6)	235	(95.9)	401	(95.5)
	その他	2	(3.7)	11	(9.1)	16	(6.5)	29	(6.9)
②女性		n=24		n=74		n=127		n=225	
	日本人	23	(95.8)	71	(95.9)	117	(92.1)	211	(93.8)
	その他	2	(8.3)	3	(4.1)	10	(7.9)	15	(6.7)
①+② 全体		n=78		n=195		n=372		n=645	
	日本人	77	(98.7)	183	(93.8)	352	(94.6)	612	(94.9)
	その他	4	(5.1)	14	(7.2)	26	(7.0)	44	(6.8)

表5. コンドーム使用状況(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間に経験した性行為(複数回答)									
※過去6か月間にセックスをしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=54		n=121		n=245		n=420	
	陰性交	52	(96.3)	104	(86.0)	223	(91.0)	379	(90.2)
	アナルセックス(挿入側)	1	(1.9)	8	(6.6)	12	(4.9)	21	(5.0)
	アナルセックス(被挿入側)	—	(0.0)	7	(5.8)	2	(0.8)	9	(2.1)
	その他	2	(3.7)	11	(9.1)	19	(7.8)	32	(7.6)
②女性		n=24		n=74		n=127		n=225	
	陰性交	21	(87.5)	64	(86.5)	109	(85.8)	194	(86.2)
	アナルセックス(挿入側)	—	(0.0)	6	(8.1)	8	(6.3)	14	(6.2)
	アナルセックス(被挿入側)	—	(0.0)	4	(5.4)	13	(10.2)	19	(8.4)
	その他	2	(8.3)	4	(5.4)	13	(10.2)	19	(8.4)
①+② 全体		n=78		n=195		n=372		n=645	
	陰性交	73	(93.6)	168	(86.2)	332	(89.2)	573	(88.8)
	アナルセックス(挿入側)	1	(1.3)	8	(4.1)	12	(3.2)	21	(3.3)
	アナルセックス(被挿入側)	—	(0.0)	13	(6.7)	10	(2.7)	23	(3.6)
	その他	4	(5.1)	15	(7.7)	32	(8.6)	51	(7.9)
■過去6か月間の陰性交におけるコンドーム使用状況									
※過去6か月間に陰性交をしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=52		n=104		n=223		n=379	
	必ず使った	25	(48.1)	44	(42.3)	107	(48.0)	176	(46.4)
	使うことが多かった	7	(13.5)	17	(16.3)	48	(21.5)	72	(19.0)
	五分五分	7	(13.5)	21	(20.2)	29	(13.0)	57	(15.0)
	使わないことが多かった	4	(7.7)	9	(8.7)	20	(9.0)	33	(8.7)
	全く使わなかった	9	(17.3)	13	(12.5)	19	(8.5)	41	(10.8)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
②女性		n=21		n=64		n=109		n=194	
	必ず使った	9	(42.9)	28	(43.8)	53	(48.6)	90	(46.4)
	使うことが多かった	3	(14.3)	8	(12.5)	19	(17.4)	30	(15.5)
	五分五分	3	(14.3)	10	(15.6)	18	(16.5)	31	(16.0)
	使わないことが多かった	4	(19.0)	7	(10.9)	9	(8.3)	20	(10.3)
	全く使わなかった	2	(9.5)	11	(17.2)	10	(9.2)	23	(11.9)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
①+② 全体		n=73		n=168		n=332		n=573	
	必ず使った	34	(46.6)	72	(42.9)	160	(48.2)	266	(46.4)
	使うことが多かった	10	(13.7)	25	(14.9)	67	(20.2)	102	(17.8)
	五分五分	10	(13.7)	31	(18.5)	47	(14.2)	88	(15.4)
	使わないことが多かった	8	(11.0)	16	(9.5)	29	(8.7)	53	(9.2)
	全く使わなかった	11	(15.1)	24	(14.3)	29	(8.7)	64	(11.2)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
■過去6か月間のアナルセックス(挿入側)におけるコンドーム使用状況									
※過去6か月間にアナルセックスをしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=1		n=8		n=12		n=21	
	必ず使った	1	(100.0)	4	(50.0)	5	(41.7)	10	(47.6)
	使うことが多かった	—	(0.0)	—	(0.0)	4	(33.3)	4	(19.0)
	五分五分	—	(0.0)	1	(12.5)	1	(8.3)	2	(9.5)
	使わないことが多かった	—	(0.0)	1	(12.5)	1	(8.3)	2	(9.5)
	全く使わなかった	—	(0.0)	1	(12.5)	1	(8.3)	2	(9.5)
	無回答	—	(0.0)	1	(12.5)	—	(0.0)	1	(4.8)
②女性		n=0		n=7		n=2		n=9	
	必ず使った	—	(0.0)	1	(14.3)	—	(0.0)	1	(11.1)
	使うことが多かった	—	(0.0)	1	(14.3)	1	(50.0)	2	(22.2)
	五分五分	—	(0.0)	1	(14.3)	1	(50.0)	2	(22.2)
	使わないことが多かった	—	(0.0)	1	(14.3)	—	(0.0)	1	(11.1)
	全く使わなかった	—	(0.0)	3	(42.9)	—	(0.0)	3	(33.3)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
①+② 全体		n=0		n=6		n=8		n=14	
	必ず使った	—	(0.0)	3	(50.0)	4	(50.0)	7	(50.0)
	使うことが多かった	—	(0.0)	2	(33.3)	—	(0.0)	2	(14.3)
	五分五分	—	(0.0)	—	(0.0)	3	(37.5)	3	(21.4)
	使わないことが多かった	—	(0.0)	1	(16.7)	1	(12.5)	2	(14.3)
	全く使わなかった	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
①+② 全体		n=0		n=13		n=10		n=23	
	必ず使った	—	(0.0)	4	(30.8)	4	(40.0)	8	(34.8)
	使うことが多かった	—	(0.0)	3	(23.1)	1	(10.0)	4	(17.4)
	五分五分	—	(0.0)	1	(7.7)	4	(40.0)	5	(21.7)
	使わないことが多かった	—	(0.0)	2	(15.4)	1	(10.0)	3	(13.0)
	全く使わなかった	—	(0.0)	3	(23.1)	—	(0.0)	3	(13.0)
	無回答	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)

表6. STI診断(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■これまでに次の性感染症について病院で診断を受けた(複数回答)									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	梅毒	—	(0.0)	7	(3.8)	22	(6.8)	29	(4.9)
	B型肝炎	—	(0.0)	4	(2.2)	8	(2.5)	12	(2.0)
	クラミジア	11	(13.8)	29	(15.7)	39	(12.1)	79	(13.4)
	淋菌感染症	4	(5.0)	5	(2.7)	15	(4.6)	24	(4.1)
	HIV感染症(エイズ)	—	(0.0)	2	(1.1)	6	(1.9)	8	(1.4)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	67	(83.8)	133	(71.9)	242	(74.9)	442	(75.2)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	梅毒	1	(3.0)	3	(2.4)	6	(3.4)	10	(3.0)
	B型肝炎	1	(3.0)	5	(4.0)	2	(1.1)	8	(2.4)
	クラミジア	7	(21.2)	14	(11.3)	31	(17.5)	52	(15.6)
	淋菌感染症	1	(3.0)	2	(1.6)	9	(5.1)	12	(3.6)
	HIV感染症(エイズ)	—	(0.0)	3	(2.4)	—	(0.0)	3	(0.9)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	24	(72.7)	99	(79.8)	130	(73.4)	253	(75.7)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	梅毒	1	(0.9)	10	(3.2)	28	(5.6)	39	(4.2)
	B型肝炎	1	(0.9)	9	(2.9)	10	(2.0)	20	(2.2)
	クラミジア	18	(15.9)	43	(13.9)	70	(14.0)	131	(14.2)
	淋菌感染症	5	(4.4)	7	(2.3)	24	(4.8)	36	(3.9)
	HIV感染症(エイズ)	—	(0.0)	5	(1.6)	6	(1.2)	11	(1.2)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	91	(80.5)	232	(75.1)	372	(74.4)	695	(75.4)
■一番最近の検査でHIVウイルス量はどの程度でしたか？									
※これまでに病院でHIV感染症(エイズ)と診断されたことがある者を分母とする。									
		n=0		n=2		n=6		n=8	
①男性	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	—	(0.0)	2	(33.3)	2	(25.0)
	検出限界以下	—	(0.0)	—	(0.0)	2	(33.3)	2	(25.0)
	検出限界以上10万コピー未満	—	(0.0)	2	(100.0)	1	(16.7)	3	(37.5)
	10万コピー以上	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(16.7)	1	(12.5)
	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
	検出限界以下	—	(0.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	1	(33.3)
②女性	検出限界以上10万コピー未満	—	(0.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	1	(33.3)
	10万コピー以上	—	(0.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	1	(33.3)
	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	—	(0.0)	2	(33.3)	2	(18.2)
	検出限界以下	—	(0.0)	1	(20.0)	2	(33.3)	3	(27.3)
	検出限界以上10万コピー未満	—	(0.0)	3	(60.0)	1	(16.7)	4	(36.4)
	10万コピー以上	—	(0.0)	1	(20.0)	1	(16.7)	2	(18.2)
		n=0		n=5		n=6		n=11	
①+② 全体	服薬している	—	(0.0)	1	(50.0)	—	(0.0)	1	(16.7)
	以前は服薬していたが今はしていない	—	(0.0)	1	(50.0)	1	(25.0)	2	(33.3)
	服薬していない	—	(0.0)	—	(0.0)	3	(75.0)	3	(50.0)
	服薬している	—	(0.0)	2	(66.7)	—	(0.0)	2	(66.7)
	以前は服薬していたが今はしていない	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
	服薬していない	—	(0.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	1	(33.3)
		n=0		n=3		n=0		n=3	
①+② 全体	服薬している	—	(0.0)	3	(60.0)	—	(0.0)	3	(33.3)
	以前は服薬していたが今はしていない	—	(0.0)	1	(20.0)	1	(25.0)	2	(22.2)
	服薬していない	—	(0.0)	1	(20.0)	3	(75.0)	4	(44.4)

表7. U=Uについて(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■U=Uについて聞いたことがありますか？									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	聞いたことがある	9	(11.3)	29	(15.7)	55	(17.0)	93	(15.8)
	聞いたことがない	30	(37.5)	51	(27.6)	101	(31.3)	182	(31.0)
	わからない	41	(51.3)	105	(56.8)	167	(51.7)	313	(53.2)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	聞いたことがある	1	(3.0)	14	(11.3)	32	(18.1)	47	(14.1)
	聞いたことがない	9	(27.3)	27	(21.8)	50	(28.2)	86	(25.7)
	わからない	23	(69.7)	83	(66.9)	95	(53.7)	201	(60.2)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	聞いたことがある	10	(8.8)	43	(13.9)	87	(17.4)	140	(15.2)
	聞いたことがない	39	(34.5)	78	(25.2)	151	(30.2)	268	(29.1)
	わからない	64	(56.6)	188	(60.8)	262	(52.4)	514	(55.7)

■U=Uの状態であれば、コンドームを使用しないセックスでHIVに感染する心配はないと考えますか？

※U=Uについて聞いたことがある者を分母とする。

		n=9		n=29		n=55		n=93	
①男性	心配はない	2	(22.2)	16	(55.2)	20	(36.4)	38	(40.9)
	心配がある	6	(66.7)	9	(31.0)	26	(47.3)	41	(44.1)
	わからない	1	(11.1)	4	(13.8)	9	(16.4)	14	(15.1)
		n=1		n=14		n=32		n=47	
②女性	心配はない	1	(100.0)	5	(35.7)	6	(18.8)	12	(25.5)
	心配がある	—	(0.0)	7	(50.0)	20	(62.5)	27	(57.4)
	わからない	—	(0.0)	2	(14.3)	6	(18.8)	8	(17.0)
		n=10		n=43		n=87		n=140	
①+② 全体	心配はない	3	(30.0)	21	(48.8)	26	(29.9)	50	(35.7)
	心配がある	6	(60.0)	16	(37.2)	46	(52.9)	68	(48.6)
	わからない	1	(10.0)	6	(14.0)	15	(17.2)	22	(15.7)

表8. PrEPについて(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIVに感染していない人が、セックスの前にHIVの治療薬を飲むことでHIVを予防すること(PrEP: プレップと呼ばれています)を聞いたことがありますか？									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	聞いたことがある	12	(15.0)	24	(13.0)	50	(15.5)	86	(14.6)
	聞いたことがない	29	(36.3)	57	(30.8)	98	(30.3)	184	(31.3)
	わからない	39	(48.8)	104	(56.2)	175	(54.2)	318	(54.1)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	聞いたことがある	1	(3.0)	14	(11.3)	26	(14.7)	41	(12.3)
	聞いたことがない	10	(30.3)	37	(29.8)	45	(25.4)	92	(27.5)
	わからない	22	(66.7)	73	(58.9)	106	(59.9)	201	(60.2)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	聞いたことがある	13	(11.5)	38	(12.3)	76	(15.2)	127	(13.8)
	聞いたことがない	39	(34.5)	94	(30.4)	143	(28.6)	276	(29.9)
	わからない	61	(54.0)	177	(57.3)	281	(56.2)	519	(56.3)
■セックスの前にHIVの治療薬を飲むことでHIVを予防すること(PrEP: プレップ)を、信頼していますか？									
		n=12		n=24		n=50		n=86	
①男性	信頼している	9	(75.0)	13	(54.2)	28	(56.0)	50	(58.1)
	信頼していない	2	(16.7)	7	(29.2)	14	(28.0)	23	(26.7)
	わからない	1	(8.3)	4	(16.7)	8	(16.0)	13	(15.1)
		n=1		n=14		n=26		n=41	
②女性	信頼している	—	(0.0)	7	(50.0)	14	(53.8)	21	(51.2)
	信頼していない	—	(0.0)	1	(7.1)	7	(26.9)	8	(19.5)
	わからない	1	(100.0)	6	(42.9)	5	(19.2)	12	(29.3)
		n=13		n=38		n=76		n=127	
①+② 全体	信頼している	9	(69.2)	20	(52.6)	42	(55.3)	71	(55.9)
	信頼していない	2	(15.4)	8	(21.1)	21	(27.6)	31	(24.4)
	わからない	2	(15.4)	10	(26.3)	13	(17.1)	25	(19.7)

		札幌		名古屋		大阪		全体		
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■性の安全と関連する項目のこれまでの経験										
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588		
	浮気をした	24	(30.0)	39	(21.1)	76	(23.5)	139	(23.6)	0.577
	浮気をされた	17	(21.3)	35	(18.9)	51	(15.8)	103	(17.5)	0.712
	酔いつぶれ(酒で記憶をなくした)	21	(26.3)	31	(16.8)	83	(25.7)	135	(23.0)	0.174
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	2	(2.5)	7	(3.8)	9	(2.8)	18	(3.1)	0.912
	自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	1	(1.3)	7	(3.8)	9	(2.8)	17	(2.9)	0.771
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」とあなたが誰かに言ったこと	-	(0.0)	9	(4.9)	9	(2.8)	18	(3.1)	0.272
	睡眠薬・睡眠導入剤	3	(3.8)	3	(1.6)	7	(2.2)	13	(2.2)	0.799
	大麻	1	(1.3)	3	(1.6)	11	(3.4)	15	(2.6)	0.619
	覚せい剤	-	(0.0)	1	(0.5)	2	(0.6)	3	(0.5)	0.912
	MDMA(エクスタシー)	1	(1.3)	2	(1.1)	5	(1.5)	8	(1.4)	0.952
	コカイン	1	(1.3)	2	(1.1)	2	(0.6)	5	(0.9)	0.916
	危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)	1	(1.3)	3	(1.6)	5	(1.5)	9	(1.5)	0.969
	その他の薬物の使用	1	(1.3)	2	(1.1)	3	(0.9)	6	(1.0)	0.967
	上記いずれもない	34	(42.5)	94	(50.8)	141	(43.7)	269	(45.7)	0.500
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334		
	浮気をした	5	(15.2)	13	(10.5)	39	(22.0)	57	(17.1)	0.103
	浮気をされた	14	(42.4)	22	(17.7)	37	(20.9)	73	(21.9)	0.030
	酔いつぶれ(酒で記憶をなくした)	7	(21.2)	18	(14.5)	35	(19.8)	60	(18.0)	0.634
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	7	(21.2)	7	(5.6)	11	(6.2)	25	(7.5)	0.025
	自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	2	(6.1)	6	(4.8)	5	(2.8)	13	(3.9)	0.678
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」とあなたが誰かに言ったこと	-	(0.0)	2	(1.6)	1	(0.6)	3	(0.9)	0.690
	睡眠薬・睡眠導入剤	2	(6.1)	1	(0.8)	3	(1.7)	6	(1.8)	0.274
	大麻	-	(0.0)	1	(0.8)	2	(1.1)	3	(0.9)	0.843
	覚せい剤	-	(0.0)	1	(0.8)	1	(0.6)	2	(0.6)	0.862
	MDMA(エクスタシー)	1	(3.0)	-	(0.0)	1	(0.6)	2	(0.6)	0.283
	コカイン	-	(0.0)	1	(0.8)	-	(0.0)	1	(0.3)	0.607
	危険ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)	-	(0.0)	2	(1.6)	1	(0.6)	3	(0.9)	0.690
	その他の薬物の使用	-	(0.0)	1	(0.8)	1	(0.6)	2	(0.6)	0.862
	上記いずれもない	12	(36.4)	69	(55.6)	97	(54.8)	178	(53.3)	0.283
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922		
	浮気をした	29	(25.7)	52	(16.8)	115	(23.0)	196	(21.3)	0.186
	浮気をされた	31	(27.4)	57	(18.4)	88	(17.6)	176	(19.1)	0.171
	酔いつぶれ(酒で記憶をなくした)	28	(24.8)	49	(15.9)	118	(23.6)	195	(21.1)	0.085
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	9	(8.0)	14	(4.5)	20	(4.0)	43	(4.7)	0.437
	自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	3	(2.7)	13	(4.2)	14	(2.8)	30	(3.3)	0.759
	「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」とあなたが誰かに言ったこと	-	(0.0)	11	(3.6)	10	(2.0)	21	(2.3)	0.229
	睡眠薬・睡眠導入剤	5	(4.4)	4	(1.3)	10	(2.0)	19	(2.1)	0.341
	大麻	1	(0.9)	4	(1.3)	13	(2.6)	18	(2.0)	0.568
	覚せい剤	-	(0.0)	2	(0.6)	3	(0.6)	5	(0.5)	0.877
	MDMA(エクスタシー)	2	(1.8)	2						

①+②
全体

表10. 強引にしたこと・されたこと(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ 以下のような場面で、これまでに強引なナンパをした経験はありますか									
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588	
	路上	8	(10.0)	25	(13.5)	50	(15.5)	83	(14.1)
	居酒屋	9	(11.3)	9	(4.9)	31	(9.6)	49	(8.3)
	クラブ	11	(13.8)	39	(21.1)	65	(20.1)	115	(19.6)
	その他の場所で	1	(1.3)	8	(4.3)	14	(4.3)	23	(3.9)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	55	(68.8)	114	(61.6)	197	(61.0)	366	(62.2)
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334	
	路上	—	(0.0)	12	(9.7)	14	(7.9)	26	(7.8)
	居酒屋	—	(0.0)	6	(4.8)	13	(7.3)	19	(5.7)
	クラブ	4	(12.1)	20	(16.1)	21	(11.9)	45	(13.5)
	その他の場所で	2	(6.1)	4	(3.2)	5	(2.8)	11	(3.3)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	26	(78.8)	87	(70.2)	130	(73.4)	243	(72.8)
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922	
	路上	8	(7.1)	37	(12.0)	64	(12.8)	109	(11.8)
	居酒屋	9	(8.0)	15	(4.9)	44	(8.8)	68	(7.4)
	クラブ	15	(13.3)	59	(19.1)	86	(17.2)	160	(17.4)
	その他の場所で	3	(2.7)	12	(3.9)	19	(3.8)	34	(3.7)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	81	(71.7)	201	(65.0)	327	(65.4)	609	(66.1)
■ 以下のような場面で、これまでに強引なナンパをされた経験はありますか									
①男性		n=80		n=185		n=323		n=588	
	路上	1	(1.3)	18	(9.7)	44	(13.6)	63	(10.7)
	居酒屋	9	(11.3)	16	(8.6)	36	(11.1)	61	(10.4)
	クラブ	11	(13.8)	28	(15.1)	48	(14.9)	87	(14.8)
	その他の場所で	8	(10.0)	13	(7.0)	17	(5.3)	38	(6.5)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	53	(66.3)	117	(63.2)	204	(63.2)	374	(63.6)
②女性		n=33		n=124		n=177		n=334	
	路上	11	(33.3)	28	(22.6)	46	(26.0)	85	(25.4)
	居酒屋	5	(15.2)	20	(16.1)	27	(15.3)	52	(15.6)
	クラブ	11	(33.3)	42	(33.9)	63	(35.6)	116	(34.7)
	その他の場所で	3	(9.1)	8	(6.5)	13	(7.3)	24	(7.2)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	14	(42.4)	62	(50.0)	91	(51.4)	167	(50.0)
①+② 全体		n=113		n=309		n=500		n=922	
	路上	12	(10.6)	46	(14.9)	90	(18.0)	148	(16.1)
	居酒屋	14	(12.4)	36	(11.7)	63	(12.6)	113	(12.3)
	クラブ	22	(19.5)	70	(22.7)	111	(22.2)	203	(22.0)
	その他の場所で	11	(9.7)	21	(6.8)	30	(6.0)	62	(6.7)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	67	(59.3)	179	(57.9)	295	(59.0)	541	(58.7)

表10. 強引にしたこと・されたこと(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■バーなどで、他人のお酒に睡眠薬など薬物を入れたことがありますか									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	ある	2	(2.5)	18	(9.7)	27	(8.4)	47	(8.0)
	ない	58	(72.5)	110	(59.5)	193	(59.8)	361	(61.4)
	覚えていない	20	(25.0)	55	(29.7)	99	(30.7)	174	(29.6)
	無回答	—	(0.0)	2	(1.1)	4	(1.2)	6	(1.0)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	ある	1	(3.0)	4	(3.2)	4	(2.3)	9	(2.7)
	ない	26	(78.8)	64	(51.6)	123	(69.5)	213	(63.8)
	覚えていない	5	(15.2)	53	(42.7)	47	(26.6)	105	(31.4)
	無回答	1	(3.0)	3	(2.4)	3	(1.7)	7	(2.1)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	ある	3	(2.7)	22	(7.1)	31	(6.2)	56	(6.1)
	ない	84	(74.3)	174	(56.3)	316	(63.2)	574	(62.3)
	覚えていない	25	(22.1)	108	(35.0)	146	(29.2)	279	(30.3)
	無回答	1	(0.9)	5	(1.6)	7	(1.4)	13	(1.4)

■バーなどで、自分のお酒に睡眠薬など薬物を入られたことがありますか

		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	ある	2	(2.5)	14	(7.6)	30	(9.3)	46	(7.8)
	ない	58	(72.5)	114	(61.6)	194	(60.1)	366	(62.2)
	覚えていない	19	(23.8)	54	(29.2)	90	(27.9)	163	(27.7)
	無回答	1	(1.3)	3	(1.6)	9	(2.8)	13	(2.2)
		n=33		n=124		n=177		n=334	
②女性	ある	—	(0.0)	6	(4.8)	10	(5.6)	16	(4.8)
	ない	27	(81.8)	63	(50.8)	118	(66.7)	208	(62.3)
	覚えていない	5	(15.2)	52	(41.9)	47	(26.6)	104	(31.1)
	無回答	1	(3.0)	3	(2.4)	2	(1.1)	6	(1.8)
		n=113		n=309		n=500		n=922	
①+② 全体	ある	2	(1.8)	20	(6.5)	40	(8.0)	62	(6.7)
	ない	85	(75.2)	177	(57.3)	312	(62.4)	574	(62.3)
	覚えていない	24	(21.2)	106	(34.3)	137	(27.4)	267	(29.0)
	無回答	2	(1.8)	6	(1.9)	11	(2.2)	19	(2.1)

表11. マスターベーションのすることについて(地域別)

		札幌		名古屋		大阪		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■あなたの1週間あたりのマスターベーションの回数を教えてください ※男性の方のみ									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	ほぼ毎日	14	(17.5)	41	(22.2)	76	(23.5)	131	(22.3)
	週3-4回	12	(15.0)	32	(17.3)	56	(17.3)	100	(17.0)
	週1-2回	20	(25.0)	33	(17.8)	64	(19.8)	117	(19.9)
	月2-3回	8	(10.0)	16	(8.6)	20	(6.2)	44	(7.5)
	月1回	5	(6.3)	9	(4.9)	16	(5.0)	30	(5.1)
	数ヵ月に1回程度	6	(7.5)	10	(5.4)	13	(4.0)	29	(4.9)
	上記以外の回数	2	(2.5)	6	(3.2)	8	(2.5)	16	(2.7)
	一切しない	13	(16.3)	36	(19.5)	67	(20.7)	116	(19.7)
	無回答	—	(0.0)	2	(1.1)	3	(0.9)	5	(0.9)

■普段行うマスターベーションの方法を教えてください

※男性の方のみ									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	手を上下にさせ、ペニスを刺激する	54	(67.5)	113	(61.1)	197	(61.0)	364	(61.9)
	射精の直前に寸止めする	4	(5.0)	10	(5.4)	12	(3.7)	26	(4.4)
	脚(あし)をピン緊張させた状態で行う	4	(5.0)	11	(5.9)	19	(5.9)	34	(5.8)
	ローションを使用する(オナホールを使用する際のローションは除く)	1	(1.3)	9	(4.9)	12	(3.7)	22	(3.7)
	布団や畳、床などにこすりつける	—	(0.0)	4	(2.2)	14	(4.3)	18	(3.1)
	オナホールを使う	4	(5.0)	5	(2.7)	15	(4.6)	24	(4.1)
	その他	19	(23.8)	45	(24.3)	82	(25.4)	146	(24.8)

■マスターベーションのすることについて、気軽に相談出来る人はいますか?

※男性の方のみ									
		n=80		n=185		n=323		n=588	
①男性	同性の友人	31	(38.8)	79	(42.7)	136	(42.1)	246	(41.8)
	恋人/配偶者	9	(11.3)	16	(8.6)	25	(7.7)	50	(8.5)
	学校/職場の同級生/同僚	3	(3.8)	15	(8.1)	21	(6.5)	39	(6.6)
	異性の友人	2	(2.5)	16	(8.6)	17	(5.3)	35	(6.0)
	同性の兄弟	2	(2.5)	7	(3.8)	15	(4.6)	24	(4.1)
	その他	8	(10.0)	11	(5.9)	13	(4.0)	32	(5.4)
	相談できる相手はいない	32	(40.0)	54	(29.2)	111	(34.4)	197	(33.5)

表1. 基本属性(年齢別)

	①男性	②女性	全体
■年齢平均			
有効	588	334	922
平均値	25.93	24.13	25.28
中央値	25.00	23.00	24.00
標準偏差	5.913	4.458	5.496
最小値	18	18	18
最大値	60	52	60

※60歳以上の方は60歳として算出

表1. 基本属性(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体		p値
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
■地域										
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588		<0.001
	札幌	15	(9.0)	44	(14.3)	21	(18.6)	80	(13.6)	
	名古屋	99	(59.3)	67	(21.8)	19	(16.8)	185	(31.5)	
	大阪	53	(31.7)	197	(64.0)	73	(64.6)	323	(54.9)	
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334		<0.001
	札幌	16	(11.0)	14	(8.9)	3	(10.0)	33	(9.9)	
	名古屋	93	(63.7)	27	(17.1)	4	(13.3)	124	(37.1)	
	大阪	37	(25.3)	117	(74.1)	23	(76.7)	177	(53.0)	
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922		<0.001
	札幌	31	(9.9)	58	(12.4)	24	(16.8)	113	(12.3)	
	名古屋	192	(61.3)	94	(20.2)	23	(16.1)	309	(33.5)	
	大阪	90	(28.8)	314	(67.4)	96	(67.1)	500	(54.2)	
■最終学歴を教えてください。										
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588		0.002
	中学卒業	6	(3.6)	11	(3.6)	2	(1.8)	19	(3.2)	
	高校在学中・卒業	56	(33.5)	53	(17.2)	21	(18.6)	130	(22.1)	
	専門学校在学中・卒業	19	(11.4)	32	(10.4)	14	(12.4)	65	(11.1)	
	高専在学中・卒業	7	(4.2)	15	(4.9)	7	(6.2)	29	(4.9)	
	短大在学中・卒業	6	(3.6)	6	(1.9)	5	(4.4)	17	(2.9)	
	大学在学中・卒業	41	(24.6)	120	(39.0)	43	(38.1)	204	(34.7)	
	大学院在学中・修了	2	(1.2)	19	(6.2)	10	(8.8)	31	(5.3)	
	その他	25	(15.0)	41	(13.3)	7	(6.2)	73	(12.4)	
無回答	5	(3.0)	11	(3.6)	4	(3.5)	20	(3.4)		
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334		0.115
	中学卒業	2	(1.4)	3	(1.9)	1	(3.3)	6	(1.8)	
	高校在学中・卒業	36	(24.7)	24	(15.2)	9	(30.0)	69	(20.7)	
	専門学校在学中・卒業	28	(19.2)	31	(19.6)	4	(13.3)	63	(18.9)	
	高専在学中・卒業	9	(6.2)	11	(7.0)	1	(3.3)	21	(6.3)	
	短大在学中・卒業	6	(4.1)	11	(7.0)	4	(13.3)	21	(6.3)	
	大学在学中・卒業	43	(29.5)	46	(29.1)	7	(23.3)	96	(28.7)	
	大学院在学中・修了	1	(0.7)	13	(8.2)	—	(0.0)	14	(4.2)	
	その他	18	(12.3)	17	(10.8)	4	(13.3)	39	(11.7)	
無回答	3	(2.1)	2	(1.3)	—	(0.0)	5	(1.5)		
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922		<0.001
	中学卒業	8	(2.6)	14	(3.0)	3	(2.1)	25	(2.7)	
	高校在学中・卒業	92	(29.4)	77	(16.5)	30	(21.0)	199	(21.6)	
	専門学校在学中・卒業	47	(15.0)	63	(13.5)	18	(12.6)	128	(13.9)	
	高専在学中・卒業	16	(5.1)	26	(5.6)	8	(5.6)	50	(5.4)	
	短大在学中・卒業	12	(3.8)	17	(3.6)	9	(6.3)	38	(4.1)	
	大学在学中・卒業	84	(26.8)	166	(35.6)	50	(35.0)	300	(32.5)	
	大学院在学中・修了	3	(1.0)	32	(6.9)	10	(7.0)	45	(4.9)	
	その他	43	(13.7)	58	(12.4)	11	(7.7)	112	(12.1)	
無回答	8	(2.6)	13	(2.8)	4	(2.8)	25	(2.7)		

表1. 基本属性(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■職業									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	学生	69	(41.3)	26	(8.4)	4	(3.5)	99	(16.8)
	パート・アルバイト	10	(6.0)	19	(6.2)	5	(4.4)	34	(5.8)
	常勤(正規雇用)	41	(24.6)	158	(51.3)	71	(62.8)	270	(45.9)
	常勤(非正規雇用)	7	(4.2)	14	(4.5)	5	(4.4)	26	(4.4)
	自営業	9	(5.4)	29	(9.4)	17	(15.0)	55	(9.4)
	主婦・主夫	—	(0.0)	3	(1.0)	—	(0.0)	3	(0.5)
	無職	5	(3.0)	6	(1.9)	—	(0.0)	11	(1.9)
	その他	23	(13.8)	43	(14.0)	8	(7.1)	74	(12.6)
無回答		3	(1.8)	10	(3.2)	3	(2.7)	16	(2.7)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	学生	64	(43.8)	10	(6.3)	—	(0.0)	74	(22.2)
	パート・アルバイト	17	(11.6)	21	(13.3)	6	(20.0)	44	(13.2)
	常勤(正規雇用)	31	(21.2)	85	(53.8)	9	(30.0)	125	(37.4)
	常勤(非正規雇用)	5	(3.4)	4	(2.5)	2	(6.7)	11	(3.3)
	自営業	8	(5.5)	10	(6.3)	4	(13.3)	22	(6.6)
	主婦・主夫	2	(1.4)	4	(2.5)	3	(10.0)	9	(2.7)
	無職	1	(0.7)	4	(2.5)	—	(0.0)	5	(1.5)
	その他	15	(10.3)	18	(11.4)	6	(20.0)	39	(11.7)
無回答		3	(2.1)	2	(1.3)	—	(0.0)	5	(1.5)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	学生	133	(42.5)	36	(7.7)	4	(2.8)	173	(18.8)
	パート・アルバイト	27	(8.6)	40	(8.6)	11	(7.7)	78	(8.5)
	常勤(正規雇用)	72	(23.0)	243	(52.1)	80	(55.9)	395	(42.8)
	常勤(非正規雇用)	12	(3.8)	18	(3.9)	7	(4.9)	37	(4.0)
	自営業	17	(5.4)	39	(8.4)	21	(14.7)	77	(8.4)
	主婦・主夫	2	(0.6)	7	(1.5)	3	(2.1)	12	(1.3)
	無職	6	(1.9)	10	(2.1)	—	(0.0)	16	(1.7)
	その他	38	(12.1)	61	(13.1)	14	(9.8)	113	(12.3)
無回答		6	(1.9)	12	(2.6)	3	(2.1)	21	(2.3)
■恋愛対象の性別									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	男性	17	(10.2)	26	(8.4)	6	(5.3)	49	(8.3)
	女性	147	(88.0)	278	(90.3)	105	(92.9)	530	(90.1)
	男女両方	1	(0.6)	2	(0.6)	1	(0.9)	4	(0.7)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ:	2	(1.2)	1	(0.3)	1	(0.9)	4	(0.7)
	その他	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
無回答		—	(0.0)	1	(0.3)	—	(0.0)	1	(0.2)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	男性	118	(80.8)	120	(75.9)	26	(86.7)	264	(79.0)
	女性	17	(11.6)	21	(13.3)	2	(6.7)	40	(12.0)
	男女両方	5	(3.4)	12	(7.6)	2	(6.7)	19	(5.7)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ:	3	(2.1)	3	(1.9)	—	(0.0)	6	(1.8)
	その他	2	(1.4)	2	(1.3)	—	(0.0)	4	(1.2)
無回答		1	(0.7)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(0.3)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	男性	135	(43.1)	146	(31.3)	32	(22.4)	313	(33.9)
	女性	164	(52.4)	299	(64.2)	107	(74.8)	570	(61.8)
	男女両方	6	(1.9)	14	(3.0)	3	(2.1)	23	(2.5)
	誰に対しても恋愛感情や性的魅力を感じ:	5	(1.6)	4	(0.9)	1	(0.7)	10	(1.1)
	その他	2	(0.6)	2	(0.4)	—	(0.0)	4	(0.4)
無回答		1	(0.3)	1	(0.2)	—	(0.0)	2	(0.2)

表1. 基本属性(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■クラブ利用目的(複数回答)									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	音楽を楽しむため	128	(76.6)	180	(58.4)	67	(59.3)	375	(63.8)
	ダンスを楽しむため	45	(26.9)	76	(24.7)	38	(33.6)	159	(27.0)
	友達や仲間と会うため	34	(20.4)	65	(21.1)	24	(21.2)	123	(20.9)
	ナンパするため	41	(24.6)	85	(27.6)	41	(36.3)	167	(28.4)
	ナンパされるため	18	(10.8)	19	(6.2)	11	(9.7)	48	(8.2)
	お酒を楽しみたいから	35	(21.0)	59	(19.2)	35	(31.0)	129	(21.9)
	ストレス解消のため	13	(7.8)	41	(13.3)	24	(21.2)	78	(13.3)
	人恋しいから	15	(9.0)	24	(7.8)	8	(7.1)	47	(8.0)
②女性	その他	8	(4.8)	16	(5.2)	5	(4.4)	29	(4.9)
		n=146		n=158		n=30		n=334	
	音楽を楽しむため	94	(64.4)	108	(68.4)	21	(70.0)	223	(66.8)
	ダンスを楽しむため	42	(28.8)	61	(38.6)	10	(33.3)	113	(33.8)
	友達や仲間と会うため	48	(32.9)	53	(33.5)	7	(23.3)	108	(32.3)
	ナンパするため	2	(1.4)	7	(4.4)	–	(0.0)	9	(2.7)
	ナンパされるため	6	(4.1)	9	(5.7)	1	(3.3)	16	(4.8)
	お酒を楽しみたいから	56	(38.4)	56	(35.4)	14	(46.7)	126	(37.7)
	ストレス解消のため	28	(19.2)	31	(19.6)	9	(30.0)	68	(20.4)
①+② 全体	人恋しいから	6	(4.1)	6	(3.8)	–	(0.0)	12	(3.6)
	その他	10	(6.8)	6	(3.8)	–	(0.0)	16	(4.8)
		n=313		n=466		n=143		n=922	
	音楽を楽しむため	222	(70.9)	288	(61.8)	88	(61.5)	598	(64.9)
	ダンスを楽しむため	87	(27.8)	137	(29.4)	48	(33.6)	272	(29.5)
	友達や仲間と会うため	82	(26.2)	118	(25.3)	31	(21.7)	231	(25.1)
	ナンパするため	43	(13.7)	92	(19.7)	41	(28.7)	176	(19.1)
	ナンパされるため	24	(7.7)	28	(6.0)	12	(8.4)	64	(6.9)
	お酒を楽しみたいから	91	(29.1)	115	(24.7)	49	(34.3)	255	(27.7)
	ストレス解消のため	41	(13.1)	72	(15.5)	33	(23.1)	146	(15.8)
	人恋しいから	21	(6.7)	30	(6.4)	8	(5.6)	59	(6.4)
	その他	18	(5.8)	22	(4.7)	5	(3.5)	45	(4.9)

表2. 知識(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ 性感染症にかかっているとHIV(エイズ)に感染しやすい									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	そう思う(正)	68	(40.7)	118	(38.3)	46	(40.7)	232	(39.5)
	そう思わない	37	(22.2)	90	(29.2)	32	(28.3)	159	(27.0)
	わからない	62	(37.1)	100	(32.5)	35	(31.0)	197	(33.5)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	そう思う(正)	38	(26.0)	52	(32.9)	10	(33.3)	100	(29.9)
	そう思わない	30	(20.5)	41	(25.9)	6	(20.0)	77	(23.1)
	わからない	78	(53.4)	65	(41.1)	14	(46.7)	157	(47.0)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	そう思う(正)	106	(33.9)	170	(36.5)	56	(39.2)	332	(36.0)
	そう思わない	67	(21.4)	131	(28.1)	38	(26.6)	236	(25.6)
	わからない	140	(44.7)	165	(35.4)	49	(34.3)	354	(38.4)
■ 性感染症に感染しても症状が出ないことがある									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	そう思う(正)	69	(41.3)	134	(43.5)	57	(50.4)	260	(44.2)
	そう思わない	34	(20.4)	72	(23.4)	25	(22.1)	131	(22.3)
	わからない	64	(38.3)	102	(33.1)	31	(27.4)	197	(33.5)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	そう思う(正)	51	(34.9)	66	(41.8)	14	(46.7)	131	(39.2)
	そう思わない	19	(13.0)	25	(15.8)	1	(3.3)	45	(13.5)
	わからない	76	(52.1)	67	(42.4)	15	(50.0)	158	(47.3)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	そう思う(正)	120	(38.3)	200	(42.9)	71	(49.7)	391	(42.4)
	そう思わない	53	(16.9)	97	(20.8)	26	(18.2)	176	(19.1)
	わからない	140	(44.7)	169	(36.3)	46	(32.2)	355	(38.5)
■ その日のうちに結果がわかるHIV(エイズ)検査がある									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	そう思う(正)	62	(37.1)	102	(33.1)	43	(38.1)	207	(35.2)
	そう思わない	32	(19.2)	73	(23.7)	27	(23.9)	132	(22.4)
	わからない	73	(43.7)	133	(43.2)	43	(38.1)	249	(42.3)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	そう思う(正)	34	(23.3)	38	(24.1)	8	(26.7)	80	(24.0)
	そう思わない	20	(13.7)	32	(20.3)	4	(13.3)	56	(16.8)
	わからない	92	(63.0)	88	(55.7)	18	(60.0)	198	(59.3)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	そう思う(正)	96	(30.7)	140	(30.0)	51	(35.7)	287	(31.1)
	そう思わない	52	(16.6)	105	(22.5)	31	(21.7)	188	(20.4)
	わからない	165	(52.7)	221	(47.4)	61	(42.7)	447	(48.5)
■ HIV(エイズ)にかかると、すぐ死ぬんじゃないかと思う									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	そう思う	46	(27.5)	72	(23.4)	19	(16.8)	137	(23.3)
	そう思わない(正)	60	(35.9)	152	(49.4)	63	(55.8)	275	(46.8)
	わからない	61	(36.5)	84	(27.3)	31	(27.4)	176	(29.9)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	そう思う	23	(15.8)	24	(15.2)	4	(13.3)	51	(15.3)
	そう思わない(正)	57	(39.0)	67	(42.4)	14	(46.7)	138	(41.3)
	わからない	66	(45.2)	67	(42.4)	12	(40.0)	145	(43.4)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	そう思う	69	(22.0)	96	(20.6)	23	(16.1)	188	(20.4)
	そう思わない(正)	117	(37.4)	219	(47.0)	77	(53.8)	413	(44.8)
	わからない	127	(40.6)	151	(32.4)	43	(30.1)	321	(34.8)

表2. 知識(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ HIV(エイズ)の検査では、内診(婦人科や産婦人科での膣の診察)がある ※女性のみに質問									
		n=146		n=158		n=30		n=334	
②女性	そう思う	56	(38.4)	70	(44.3)	14	(46.7)	140	(41.9)
	そう思わない(正)	17	(11.6)	23	(14.6)	4	(13.3)	44	(13.2)
	わからない	73	(50.0)	65	(41.1)	12	(40.0)	150	(44.9)
■ HIV(エイズ)の検査では、ペニスの診察がある ※男性のみに質問									
		n=167		n=308		n=113		n=588	
①男性	そう思う	68	(40.7)	128	(41.6)	37	(32.7)	233	(39.6)
	そう思わない(正)	30	(18.0)	83	(26.9)	33	(29.2)	146	(24.8)
	わからない	69	(41.3)	97	(31.5)	43	(38.1)	209	(35.5)
■ 不適切なマスターベーションの方法によって、セックスの時に射精しづらくなることがある ※男性のみに質問									
		n=167		n=308		n=113		n=588	
①男性	そう思う	79	(47.3)	171	(55.5)	64	(56.6)	314	(53.4)
	そう思わない(正)	32	(19.2)	63	(20.5)	16	(14.2)	111	(18.9)
	わからない	56	(33.5)	74	(24.0)	33	(29.2)	163	(27.7)
■ 献血をした人の血液からHIV(エイズウイルス)が見つかった場合、本人に感染が知られると思う									
		n=167		n=308		n=113		n=588	
①男性	そう思う	72	(43.1)	151	(49.0)	54	(47.8)	277	(47.1)
	そう思わない(正)	27	(16.2)	62	(20.1)	22	(19.5)	111	(18.9)
	わからない	68	(40.7)	95	(30.8)	37	(32.7)	200	(34.0)
		n=146		n=158		n=30		n=334	
②女性	そう思う	51	(34.9)	71	(44.9)	14	(46.7)	136	(40.7)
	そう思わない(正)	17	(11.6)	22	(13.9)	2	(6.7)	41	(12.3)
	わからない	78	(53.4)	65	(41.1)	14	(46.7)	157	(47.0)
		n=313		n=466		n=143		n=922	
①+② 全体	そう思う	123	(39.3)	222	(47.6)	68	(47.6)	413	(44.8)
	そう思わない(正)	44	(14.1)	84	(18.0)	24	(16.8)	152	(16.5)
	わからない	146	(46.6)	160	(34.3)	51	(35.7)	357	(38.7)

表3. HIV抗体検査・梅毒検査(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■これまでに、HIV(エイズ)の検査を受けたことがありますか？									
①男性	ある	n=167		n=308		n=113		n=588	
	ない	16	(9.6)	33	(10.7)	19	(16.8)	68	(11.6)
②女性	ある	n=146		n=158		n=30		n=334	
	ない	151	(90.4)	275	(89.3)	94	(83.2)	520	(88.4)
①+②		n=313		n=466		n=143		n=922	
全体		26	(8.3)	51	(10.9)	26	(18.2)	103	(11.2)
		287	(91.7)	415	(89.1)	117	(81.8)	819	(88.8)
■HIV抗体検査を受けた場所(複数回答)									
※これまでにHIV抗体検査を受けたことがある者を分母とする。									
①男性		n=16		n=33		n=19		n=68	
	保健所や保健センター	11	(68.8)	17	(51.5)	12	(63.2)	40	(58.8)
	病院・診療所・クリニック	2	(12.5)	12	(36.4)	10	(52.6)	24	(35.3)
	郵送検査	–	(0.0)	2	(6.1)	1	(5.3)	3	(4.4)
	その他	4	(25.0)	3	(9.1)	–	(0.0)	7	(10.3)
②女性		n=10		n=18		n=7		n=35	
	保健所や保健センター	5	(50.0)	5	(27.8)	4	(57.1)	14	(40.0)
	病院・診療所・クリニック	3	(30.0)	12	(66.7)	3	(42.9)	18	(51.4)
	郵送検査	1	(10.0)	1	(5.6)	–	(0.0)	2	(5.7)
	その他	1	(10.0)	1	(5.6)	–	(0.0)	2	(5.7)
①+②		n=26		n=51		n=26		n=103	
	保健所や保健センター	16	(61.5)	22	(43.1)	16	(61.5)	54	(52.4)
	病院・診療所・クリニック	5	(19.2)	24	(47.1)	13	(50.0)	42	(40.8)
	郵送検査	1	(3.8)	3	(5.9)	1	(3.8)	5	(4.9)
	その他	5	(19.2)	4	(7.8)	–	(0.0)	9	(8.7)
■これまでに、梅毒の検査を受けたことがありますか？									
①男性	ある	n=167		n=308		n=113		n=588	
	ない	10	(6.0)	41	(13.3)	16	(14.2)	67	(11.4)
②女性	ある	n=146		n=158		n=30		n=334	
	ない	157	(94.0)	267	(86.7)	97	(85.8)	521	(88.6)
①+②		n=313		n=466		n=143		n=922	
全体		25	(8.0)	58	(12.4)	25	(17.5)	108	(11.7)
		288	(92.0)	408	(87.6)	118	(82.5)	814	(88.3)
■梅毒検査を受けた場所(複数回答)									
※これまでに梅毒検査を受けたことがある者を分母とする。									
①男性		n=10		n=41		n=16		n=67	
	保健所や保健センター	6	(60.0)	15	(36.6)	8	(50.0)	29	(43.3)
	病院・診療所・クリニック	3	(30.0)	24	(58.5)	9	(56.3)	36	(53.7)
	郵送検査	–	(0.0)	1	(2.4)	2	(12.5)	3	(4.5)
	その他	1	(10.0)	2	(4.9)	1	(6.3)	4	(6.0)
②女性		n=15		n=17		n=9		n=41	
	保健所や保健センター	5	(33.3)	6	(35.3)	4	(44.4)	15	(36.6)
	病院・診療所・クリニック	8	(53.3)	9	(52.9)	5	(55.6)	22	(53.7)
	郵送検査	–	(0.0)	1	(5.9)	1	(11.1)	2	(4.9)
	その他	3	(20.0)	1	(5.9)	1	(11.1)	5	(12.2)
①+②		n=25		n=58		n=25		n=108	
	保健所や保健センター	11	(44.0)	21	(36.2)	12	(48.0)	44	(40.7)
	病院・診療所・クリニック	11	(44.0)	33	(56.9)	14	(56.0)	58	(53.7)
	郵送検査	–	(0.0)	2	(3.4)	3	(12.0)	5	(4.6)
	その他	4	(16.0)	3	(5.2)	2	(8.0)	9	(8.3)
■これまでに、献血したことはありますか？									
①男性	ある	n=167		n=308		n=113		n=588	
	ない	60	(35.9)	111	(36.0)	66	(58.4)	237	(40.3)
	無回答	107	(64.1)	195	(63.3)	46	(40.7)	348	(59.2)
②女性	ある	n=146		n=158		n=30		n=334	
	ない	30	(20.5)	51	(32.3)	12	(40.0)	93	(27.8)
	無回答	112	(76.7)	104	(65.8)	17	(56.7)	233	(69.8)
①+②	ある	n=313		n=466		n=143		n=922	
	ない	90	(28.8)	162	(34.8)	78	(54.5)	330	(35.8)
	無回答	219	(70.0)	299	(64.2)	63	(44.1)	581	(63.0)
全体		4	(1.3)	5	(1.1)	2	(1.4)	11	(1.2)

表4. 性交経験(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間のセックス経験									
①男性	した	n=167		n=308		n=113		n=588	
	していない	115	(68.9)	223	(72.4)	82	(72.6)	420	(71.4)
②女性	した	n=146		n=158		n=30		n=334	
	していない	52	(31.1)	85	(27.6)	31	(27.4)	168	(28.6)
①+② 全体	した	n=313		n=466		n=143		n=922	
	していない	202	(64.5)	338	(72.5)	105	(73.4)	645	(70.0)
		111	(35.5)	128	(27.5)	38	(26.6)	277	(30.0)
■過去6か月間にあなたがセックスした相手の性別(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=115		n=223		n=82		n=420	
	男性	5	(4.3)	16	(7.2)	4	(4.9)	25	(6.0)
	女性	105	(91.3)	202	(90.6)	77	(93.9)	384	(91.4)
	男女両方	1	(0.9)	3	(1.3)	–	(0.0)	4	(1.0)
	その他	4	(3.5)	2	(0.9)	1	(1.2)	7	(1.7)
②女性		n=87		n=115		n=23		n=225	
	男性	80	(92.0)	108	(93.9)	20	(87.0)	208	(92.4)
	女性	6	(6.9)	4	(3.5)	2	(8.7)	12	(5.3)
	男女両方	1	(1.1)	2	(1.7)	–	(0.0)	3	(1.3)
	その他	–	(0.0)	1	(0.9)	1	(4.3)	2	(0.9)
①+② 全体		n=202		n=338		n=105		n=645	
	男性	85	(42.1)	124	(36.7)	24	(22.9)	233	(36.1)
	女性	111	(55.0)	206	(60.9)	79	(75.2)	396	(61.4)
	男女両方	2	(1.0)	5	(1.5)	–	(0.0)	7	(1.1)
	その他	4	(2.0)	3	(0.9)	2	(1.9)	9	(1.4)
■過去6か月間にセックスした相手の人数									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=115		n=223		n=82		n=420	
	1人のみ	36	(31.3)	63	(28.3)	28	(34.1)	127	(30.2)
	2～3人	45	(39.1)	80	(35.9)	31	(37.8)	156	(37.1)
	4～9人	16	(13.9)	43	(19.3)	13	(15.9)	72	(17.1)
	10人以上	11	(9.6)	25	(11.2)	8	(9.8)	44	(10.5)
	答えたくない	7	(6.1)	12	(5.4)	2	(2.4)	21	(5.0)
②女性		n=87		n=115		n=23		n=225	
	1人のみ	33	(37.9)	53	(46.1)	12	(52.2)	98	(43.6)
	2～3人	34	(39.1)	44	(38.3)	7	(30.4)	85	(37.8)
	4～9人	8	(9.2)	8	(7.0)	1	(4.3)	17	(7.6)
	10人以上	4	(4.6)	4	(3.5)	1	(4.3)	9	(4.0)
	答えたくない	8	(9.2)	6	(5.2)	2	(8.7)	16	(7.1)
①+② 全体		n=202		n=338		n=105		n=645	
	1人のみ	69	(34.2)	116	(34.3)	40	(38.1)	225	(34.9)
	2～3人	79	(39.1)	124	(36.7)	38	(36.2)	241	(37.4)
	4～9人	24	(11.9)	51	(15.1)	14	(13.3)	89	(13.8)
	10人以上	15	(7.4)	29	(8.6)	9	(8.6)	53	(8.2)
	答えたくない	15	(7.4)	18	(5.3)	4	(3.8)	37	(5.7)

表4. 性交経験(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間にあなたがセックスした相手の種別(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=115		n=223		n=82		n=420	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	48	(41.7)	106	(47.5)	50	(61.0)	204	(48.6)
	友達やセフレと	61	(53.0)	116	(52.0)	36	(43.9)	213	(50.7)
	(自分が)お金を払った相手と	4	(3.5)	12	(5.4)	6	(7.3)	22	(5.2)
	(自分に)お金をくれた相手と	2	(1.7)	3	(1.3)	2	(2.4)	7	(1.7)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	6	(5.2)	10	(4.5)	5	(6.1)	21	(5.0)
	街やクラブでナンパした(された)相手と	21	(18.3)	21	(9.4)	17	(20.7)	59	(14.0)
	その他	4	(3.5)	7	(3.1)	3	(3.7)	14	(3.3)
②女性		n=87		n=115		n=23		n=225	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	42	(48.3)	66	(57.4)	15	(65.2)	123	(54.7)
	友達やセフレと	39	(44.8)	56	(48.7)	7	(30.4)	102	(45.3)
	(自分が)お金を払った相手と	3	(3.4)	2	(1.7)	1	(4.3)	6	(2.7)
	(自分に)お金をくれた相手と	4	(4.6)	2	(1.7)	1	(4.3)	7	(3.1)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	3	(3.4)	4	(3.5)	—	(0.0)	7	(3.1)
	街やクラブでナンパした(された)相手と	14	(16.1)	12	(10.4)	1	(4.3)	27	(12.0)
	その他	6	(6.9)	3	(2.6)	2	(8.7)	11	(4.9)
①+② 全体		n=202		n=338		n=105		n=645	
	恋人・パートナーや配偶者など特定の相手と	90	(44.6)	172	(50.9)	65	(61.9)	327	(50.7)
	友達やセフレと	100	(49.5)	172	(50.9)	43	(41.0)	315	(48.8)
	(自分が)お金を払った相手と	7	(3.5)	14	(4.1)	7	(6.7)	28	(4.3)
	(自分に)お金をくれた相手と	6	(3.0)	5	(1.5)	3	(2.9)	14	(2.2)
	SNSや出会い系アプリで知り合った相手と	9	(4.5)	14	(4.1)	5	(4.8)	28	(4.3)
	街やクラブでナンパした(された)相手と	35	(17.3)	33	(9.8)	18	(17.1)	86	(13.3)
	その他	10	(5.0)	10	(3.0)	5	(4.8)	25	(3.9)
■過去6か月間のセックス相手の国籍(複数回答)									
※過去6か月間にセックスしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=115		n=223		n=82		n=420	
	日本人	109	(94.8)	213	(95.5)	79	(96.3)	401	(95.5)
	その他	8	(7.0)	15	(6.7)	6	(7.3)	29	(6.9)
②女性		n=87		n=115		n=23		n=225	
	日本人	83	(95.4)	107	(93.0)	21	(91.3)	211	(93.8)
	その他	4	(4.6)	8	(7.0)	3	(13.0)	15	(6.7)
①+② 全体		n=202		n=338		n=105		n=645	
	日本人	192	(95.0)	320	(94.7)	100	(95.2)	612	(94.9)
	その他	12	(5.9)	23	(6.8)	9	(8.6)	44	(6.8)

表5. コンドーム使用状況(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■過去6か月間に経験した性行為(複数回答)									
※過去6か月間にセックスをしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=115		n=223		n=82		n=420	
	陰性交	100	(87.0)	201	(90.1)	78	(95.1)	379	(90.2)
	アナルセックス(挿入側)	6	(5.2)	13	(5.8)	2	(2.4)	21	(5.0)
	アナルセックス(被挿入側)	5	(4.3)	4	(1.8)	–	(0.0)	9	(2.1)
	その他	12	(10.4)	17	(7.6)	3	(3.7)	32	(7.6)
②女性		n=87		n=115		n=23		n=225	
	陰性交	72	(82.8)	102	(88.7)	20	(87.0)	194	(86.2)
	アナルセックス(挿入側)								
	アナルセックス(被挿入側)	8	(9.2)	6	(5.2)	–	(0.0)	14	(6.2)
	その他	8	(9.2)	9	(7.8)	2	(8.7)	19	(8.4)
①+② 全体		n=202		n=338		n=105		n=645	
	陰性交	172	(85.1)	303	(89.6)	98	(93.3)	573	(88.8)
	アナルセックス(挿入側)	6	(3.0)	13	(3.8)	2	(1.9)	21	(3.3)
	アナルセックス(被挿入側)	13	(6.4)	10	(3.0)	–	(0.0)	23	(3.6)
	その他	20	(9.9)	26	(7.7)	5	(4.8)	51	(7.9)
■過去6か月間の陰性交におけるコンドーム使用状況									
※過去6か月間に陰性交をしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=100		n=201		n=78		n=379	
	必ず使った	52	(52.0)	89	(44.3)	35	(44.9)	176	(46.4)
	使うことが多かった	11	(11.0)	45	(22.4)	16	(20.5)	72	(19.0)
	五分五分	17	(17.0)	36	(17.9)	4	(5.1)	57	(15.0)
	使わないことが多かった	9	(9.0)	18	(9.0)	6	(7.7)	33	(8.7)
	全く使わなかった	11	(11.0)	13	(6.5)	17	(21.8)	41	(10.8)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
②女性		n=72		n=102		n=20		n=194	
	必ず使った	33	(45.8)	48	(47.1)	9	(45.0)	90	(46.4)
	使うことが多かった	8	(11.1)	19	(18.6)	3	(15.0)	30	(15.5)
	五分五分	10	(13.9)	18	(17.6)	3	(15.0)	31	(16.0)
	使わないことが多かった	11	(15.3)	8	(7.8)	1	(5.0)	20	(10.3)
	全く使わなかった	10	(13.9)	9	(8.8)	4	(20.0)	23	(11.9)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
①+② 全体		n=172		n=303		n=98		n=573	
	必ず使った	85	(49.4)	137	(45.2)	44	(44.9)	266	(46.4)
	使うことが多かった	19	(11.0)	64	(21.1)	19	(19.4)	102	(17.8)
	五分五分	27	(15.7)	54	(17.8)	7	(7.1)	88	(15.4)
	使わないことが多かった	20	(11.6)	26	(8.6)	7	(7.1)	53	(9.2)
	全く使わなかった	21	(12.2)	22	(7.3)	21	(21.4)	64	(11.2)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
■過去6か月間のアナルセックス(挿入側)におけるコンドーム使用状況									
※過去6か月間にアナルセックスをしたことがある者を分母とする。									
①男性		n=6		n=13		n=2		n=21	
	必ず使った	4	(66.7)	5	(38.5)	1	(50.0)	10	(47.6)
	使うことが多かった	–	(0.0)	3	(23.1)	1	(50.0)	4	(19.0)
	五分五分	1	(16.7)	1	(7.7)	–	(0.0)	2	(9.5)
	使わないことが多かった	–	(0.0)	2	(15.4)	–	(0.0)	2	(9.5)
	全く使わなかった	–	(0.0)	2	(15.4)	–	(0.0)	2	(9.5)
	無回答	1	(16.7)	–	(0.0)	–	(0.0)	1	(4.8)
②女性		n=5		n=4		n=0		n=9	
	必ず使った	1	(20.0)	–	(0.0)	–	–	1	(11.1)
	使うことが多かった	1	(20.0)	1	(25.0)	–	–	2	(22.2)
	五分五分	1	(20.0)	1	(25.0)	–	–	2	(22.2)
	使わないことが多かった	1	(20.0)	–	(0.0)	–	–	1	(11.1)
	全く使わなかった	1	(20.0)	2	(50.0)	–	–	3	(33.3)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
①+② 全体		n=8		n=6		n=0		n=14	
	必ず使った	4	(50.0)	3	(50.0)	–	–	7	(50.0)
	使うことが多かった	2	(25.0)	–	(0.0)	–	–	2	(14.3)
	五分五分	2	(25.0)	1	(16.7)	–	–	3	(21.4)
	使わないことが多かった	–	(0.0)	2	(33.3)	–	–	2	(14.3)
	全く使わなかった	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)
①+② 全体		n=13		n=10		n=0		n=23	
	必ず使った	5	(38.5)	3	(30.0)	–	–	8	(34.8)
	使うことが多かった	3	(23.1)	1	(10.0)	–	–	4	(17.4)
	五分五分	3	(23.1)	2	(20.0)	–	–	5	(21.7)
	使わないことが多かった	1	(7.7)	2	(20.0)	–	–	3	(13.0)
	全く使わなかった	1	(7.7)	2	(20.0)	–	–	3	(13.0)
	無回答	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)	–	(0.0)

表6. STI診断(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■これまでに次の性感染症について病院で診断を受けた(複数回答)									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	梅毒	6	(3.6)	15	(4.9)	8	(7.1)	29	(4.9)
	B型肝炎	5	(3.0)	5	(1.6)	2	(1.8)	12	(2.0)
	クラミジア	17	(10.2)	39	(12.7)	23	(20.4)	79	(13.4)
	淋菌感染症	6	(3.6)	10	(3.2)	8	(7.1)	24	(4.1)
	HIV感染症(エイズ)	2	(1.2)	5	(1.6)	1	(0.9)	8	(1.4)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	131	(78.4)	238	(77.3)	73	(64.6)	442	(75.2)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	梅毒	6	(4.1)	2	(1.3)	2	(6.7)	10	(3.0)
	B型肝炎	5	(3.4)	2	(1.3)	1	(3.3)	8	(2.4)
	クラミジア	15	(10.3)	26	(16.5)	11	(36.7)	52	(15.6)
	淋菌感染症	6	(4.1)	5	(3.2)	1	(3.3)	12	(3.6)
	HIV感染症(エイズ)	3	(2.1)	—	(0.0)	—	(0.0)	3	(0.9)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	119	(81.5)	120	(75.9)	14	(46.7)	253	(75.7)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	梅毒	12	(3.8)	17	(3.6)	10	(7.0)	39	(4.2)
	B型肝炎	10	(3.2)	7	(1.5)	3	(2.1)	20	(2.2)
	クラミジア	32	(10.2)	65	(13.9)	34	(23.8)	131	(14.2)
	淋菌感染症	12	(3.8)	15	(3.2)	9	(6.3)	36	(3.9)
	HIV感染症(エイズ)	5	(1.6)	5	(1.1)	1	(0.7)	11	(1.2)
	上記いずれも診断を受けた経験はない	250	(79.9)	358	(76.8)	87	(60.8)	695	(75.4)
■一番最近の検査でHIVウイルス量はどの程度でしたか？									
※これまでに病院でHIV感染症(エイズ)と診断されたことがある者を分母とする。									
①男性		n=2		n=5		n=1		n=8	
	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	2	(40.0)	—	(0.0)	2	(25.0)
	検出限界以下	—	(0.0)	1	(20.0)	1	(100.0)	2	(25.0)
	検出限界以上10万コピー未満	2	(100.0)	1	(20.0)	—	(0.0)	3	(37.5)
	10万コピー以上	—	(0.0)	1	(20.0)	—	(0.0)	1	(12.5)
②女性		n=3		n=0		n=0		n=3	
	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
	検出限界以下	1	(33.3)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(33.3)
	検出限界以上10万コピー未満	1	(33.3)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(33.3)
	10万コピー以上	1	(33.3)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(33.3)
①+② 全体		n=5		n=5		n=1		n=11	
	これまでにHIVウイルス量を測定したことがない	—	(0.0)	2	(40.0)	—	(0.0)	2	(18.2)
	検出限界以下	1	(20.0)	1	(20.0)	1	(100.0)	3	(27.3)
	検出限界以上10万コピー未満	3	(60.0)	1	(20.0)	—	(0.0)	4	(36.4)
	10万コピー以上	1	(20.0)	1	(20.0)	—	(0.0)	2	(18.2)
■HIVの治療薬を服薬していますか？									
※HIVウイルス量を測定したことがある者を分母とする。									
①男性		n=2		n=3		n=1		n=6	
	服薬している	1	(50.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(16.7)
	以前は服薬していたが今はしていない	1	(50.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	2	(33.3)
	服薬していない	—	(0.0)	2	(66.7)	1	(100.0)	3	(50.0)
②女性		n=3		n=0		n=0		n=3	
	服薬している	2	(66.7)	—	(0.0)	—	(0.0)	2	(66.7)
	以前は服薬していたが今はしていない	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	—	(0.0)
	服薬していない	1	(33.3)	—	(0.0)	—	(0.0)	1	(33.3)
①+② 全体		n=5		n=3		n=1		n=9	
	服薬している	3	(60.0)	—	(0.0)	—	(0.0)	3	(33.3)
	以前は服薬していたが今はしていない	1	(20.0)	1	(33.3)	—	(0.0)	2	(22.2)
	服薬していない	1	(20.0)	2	(66.7)	1	(100.0)	4	(44.4)

表7. U=Uについて(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■U=Uについて聞いたことがありますか？									
		n=167		n=308		n=113		n=588	
①男性	聞いたことがある	28	(16.8)	46	(14.9)	19	(16.8)	93	(15.8)
	聞いたことがない	42	(25.1)	99	(32.1)	41	(36.3)	182	(31.0)
	わからない	97	(58.1)	163	(52.9)	53	(46.9)	313	(53.2)
		n=146		n=158		n=30		n=334	
②女性	聞いたことがある	17	(11.6)	28	(17.7)	2	(6.7)	47	(14.1)
	聞いたことがない	30	(20.5)	47	(29.7)	9	(30.0)	86	(25.7)
	わからない	99	(67.8)	83	(52.5)	19	(63.3)	201	(60.2)
		n=313		n=466		n=143		n=922	
①+② 全体	聞いたことがある	45	(14.4)	74	(15.9)	21	(14.7)	140	(15.2)
	聞いたことがない	72	(23.0)	146	(31.3)	50	(35.0)	268	(29.1)
	わからない	196	(62.6)	246	(52.8)	72	(50.3)	514	(55.7)

■U=Uの状態であれば、コンドームを使用しないセックスでHIVに感染する心配はないと考えますか？

※U=Uについて聞いたことがある者を分母とする。

		n=28		n=46		n=19		n=93	
①男性	心配はない	15	(53.6)	17	(37.0)	6	(31.6)	38	(40.9)
	心配がある	9	(32.1)	21	(45.7)	11	(57.9)	41	(44.1)
	わからない	4	(14.3)	8	(17.4)	2	(10.5)	14	(15.1)
		n=17		n=28		n=2		n=47	
②女性	心配はない	6	(35.3)	5	(17.9)	1	(50.0)	12	(25.5)
	心配がある	7	(41.2)	20	(71.4)	–	(0.0)	27	(57.4)
	わからない	4	(23.5)	3	(10.7)	1	(50.0)	8	(17.0)
		n=45		n=74		n=21		n=140	
①+② 全体	心配はない	21	(46.7)	22	(29.7)	7	(33.3)	50	(35.7)
	心配がある	16	(35.6)	41	(55.4)	11	(52.4)	68	(48.6)
	わからない	8	(17.8)	11	(14.9)	3	(14.3)	22	(15.7)

表8. PrEPについて(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■HIVに感染していない人が、セックスの前にHIVの治療薬を飲むことでHIVを予防すること(PrEP: プレップと呼ばれています)を聞いたことがありますか？									
		n=167		n=308		n=113		n=588	
①男性	聞いたことがある	23	(13.8)	41	(13.3)	22	(19.5)	86	(14.6)
	聞いたことがない	43	(25.7)	106	(34.4)	35	(31.0)	184	(31.3)
	わからない	101	(60.5)	161	(52.3)	56	(49.6)	318	(54.1)
		n=146		n=158		n=30		n=334	
②女性	聞いたことがある	14	(9.6)	25	(15.8)	2	(6.7)	41	(12.3)
	聞いたことがない	42	(28.8)	39	(24.7)	11	(36.7)	92	(27.5)
	わからない	90	(61.6)	94	(59.5)	17	(56.7)	201	(60.2)
		n=313		n=466		n=143		n=922	
①+② 全体	聞いたことがある	37	(11.8)	66	(14.2)	24	(16.8)	127	(13.8)
	聞いたことがない	85	(27.2)	145	(31.1)	46	(32.2)	276	(29.9)
	わからない	191	(61.0)	255	(54.7)	73	(51.0)	519	(56.3)
■セックスの前にHIVの治療薬を飲むことでHIVを予防すること(PrEP: プレップ)を、信頼していますか？									
		n=23		n=41		n=22		n=86	
①男性	信頼している	15	(65.2)	25	(61.0)	10	(45.5)	50	(58.1)
	信頼していない	8	(34.8)	9	(22.0)	6	(27.3)	23	(26.7)
	わからない	–	(0.0)	7	(17.1)	6	(27.3)	13	(15.1)
		n=14		n=25		n=2		n=41	
②女性	信頼している	8	(57.1)	11	(44.0)	2	(100.0)	21	(51.2)
	信頼していない	2	(14.3)	6	(24.0)	–	(0.0)	8	(19.5)
	わからない	4	(28.6)	8	(32.0)	–	(0.0)	12	(29.3)
		n=37		n=66		n=24		n=127	
①+② 全体	信頼している	23	(62.2)	36	(54.5)	12	(50.0)	71	(55.9)
	信頼していない	10	(27.0)	15	(22.7)	6	(25.0)	31	(24.4)
	わからない	4	(10.8)	15	(22.7)	6	(25.0)	25	(19.7)

表9. 性の安全と関連する項目（年齢別）

	22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■性の安全と関連する項目のこれまでの経験								
	n=167		n=308		n=113		n=588	
浮気をした	24	(14.4)	72	(23.4)	43	(38.1)	139	(23.6)
浮気をされた	25	(15.0)	53	(17.2)	25	(22.1)	103	(17.5)
酔いつぶれ（酒で記憶をなくした）	25	(15.0)	69	(22.4)	41	(36.3)	135	(23.0)
「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	2	(1.2)	13	(4.2)	3	(2.7)	18	(3.1)
自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	4	(2.4)	8	(2.6)	5	(4.4)	17	(2.9)
①男性	5	(3.0)	8	(2.6)	5	(4.4)	18	(3.1)
睡眠薬・睡眠導入剤	1	(0.6)	8	(2.6)	4	(3.5)	13	(2.2)
大麻	4	(2.4)	5	(1.6)	6	(5.3)	15	(2.6)
覚せい剤	1	(0.6)	1	(0.3)	1	(0.9)	3	(0.5)
MDMA（エクスタシー）	4	(2.4)	1	(0.3)	3	(2.7)	8	(1.4)
コカイン	–	(0.0)	2	(0.6)	3	(2.7)	5	(0.9)
危険ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）	2	(1.2)	2	(0.6)	5	(4.4)	9	(1.5)
その他の薬物の使用	4	(2.4)	–	(0.0)	2	(1.8)	6	(1.0)
上記いずれもない	92	(55.1)	141	(45.8)	36	(31.9)	269	(45.7)
	n=146		n=158		n=30		n=334	
浮気をした	17	(11.6)	29	(18.4)	11	(36.7)	57	(17.1)
浮気をされた	26	(17.8)	33	(20.9)	14	(46.7)	73	(21.9)
酔いつぶれ（酒で記憶をなくした）	22	(15.1)	32	(20.3)	6	(20.0)	60	(18.0)
「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	11	(7.5)	10	(6.3)	4	(13.3)	25	(7.5)
自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	5	(3.4)	4	(2.5)	4	(13.3)	13	(3.9)
②女性	2	(1.4)	1	(0.6)	–	(0.0)	3	(0.9)
睡眠薬・睡眠導入剤	2	(1.4)	3	(1.9)	1	(3.3)	6	(1.8)
大麻	–	(0.0)	2	(1.3)	1	(3.3)	3	(0.9)
覚せい剤	–	(0.0)	1	(0.6)	1	(3.3)	2	(0.6)
MDMA（エクスタシー）	1	(0.7)	–	(0.0)	1	(3.3)	2	(0.6)
コカイン	–	(0.0)	1	(0.6)	–	(0.0)	1	(0.3)
危険ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）	–	(0.0)	1	(0.6)	2	(6.7)	3	(0.9)
その他の薬物の使用	1	(0.7)	–	(0.0)	1	(3.3)	2	(0.6)
上記いずれもない	84	(57.5)	84	(53.2)	10	(33.3)	178	(53.3)
	n=313		n=466		n=143		n=922	
浮気をした	41	(13.1)	101	(21.7)	54	(37.8)	196	(21.3)
浮気をされた	51	(16.3)	86	(18.5)	39	(27.3)	176	(19.1)
酔いつぶれ（酒で記憶をなくした）	47	(15.0)	101	(21.7)	47	(32.9)	195	(21.1)
「裸の写真や下着姿の写真を送って欲しい」と誰かから言われたこと	13	(4.2)	23	(4.9)	7	(4.9)	43	(4.7)
自分の裸や下着姿の写真を誰かに送ったこと	9	(2.9)	12	(2.6)	9	(6.3)	30	(3.3)
①+②全体	7	(2.2)	9	(1.9)	5	(3.5)	21	(2.3)
睡眠薬・睡眠導入剤	3	(1.0)	11	(2.4)	5	(3.5)	19	(2.1)
大麻	4	(1.3)	7	(1.5)	7	(4.9)	18	(2.0)
覚せい剤	1	(0.3)	2	(0.4)	2	(1.4)	5	(0.5)
MDMA（エクスタシー）	5	(1.6)	1	(0.2)	4	(2.8)	10	(1.1)
コカイン	–	(0.0)	3	(0.6)	3	(2.1)	6	(0.7)
危険ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）	2	(0.6)	3	(0.6)	7	(4.9)	12	(1.3)
その他の薬物の使用	5	(1.6)	–	(0.0)	3	(2.1)	8	(0.9)
上記いずれもない	176	(56.2)	225	(48.3)	46	(32.2)	447	(48.5)

表10. 強引にしたこと・されたこと(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■ 以下のような場面で、これまでに強引なナンパをした経験はありますか									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	路上	26	(15.6)	41	(13.3)	16	(14.2)	83	(14.1)
	居酒屋	13	(7.8)	29	(9.4)	7	(6.2)	49	(8.3)
	クラブ	27	(16.2)	63	(20.5)	25	(22.1)	115	(19.6)
	その他の場所で	6	(3.6)	13	(4.2)	4	(3.5)	23	(3.9)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	106	(63.5)	186	(60.4)	74	(65.5)	366	(62.2)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	路上	11	(7.5)	10	(6.3)	5	(16.7)	26	(7.8)
	居酒屋	10	(6.8)	8	(5.1)	1	(3.3)	19	(5.7)
	クラブ	19	(13.0)	24	(15.2)	2	(6.7)	45	(13.5)
	その他の場所で	4	(2.7)	6	(3.8)	1	(3.3)	11	(3.3)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	107	(73.3)	114	(72.2)	22	(73.3)	243	(72.8)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	路上	37	(11.8)	51	(10.9)	21	(14.7)	109	(11.8)
	居酒屋	23	(7.3)	37	(7.9)	8	(5.6)	68	(7.4)
	クラブ	46	(14.7)	87	(18.7)	27	(18.9)	160	(17.4)
	その他の場所で	10	(3.2)	19	(4.1)	5	(3.5)	34	(3.7)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	213	(68.1)	300	(64.4)	96	(67.1)	609	(66.1)
■ 以下のような場面で、これまでに強引なナンパをされた経験はありますか									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	路上	18	(10.8)	37	(12.0)	8	(7.1)	63	(10.7)
	居酒屋	19	(11.4)	30	(9.7)	12	(10.6)	61	(10.4)
	クラブ	24	(14.4)	45	(14.6)	18	(15.9)	87	(14.8)
	その他の場所で	11	(6.6)	18	(5.8)	9	(8.0)	38	(6.5)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	107	(64.1)	196	(63.6)	71	(62.8)	374	(63.6)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	路上	35	(24.0)	36	(22.8)	14	(46.7)	85	(25.4)
	居酒屋	25	(17.1)	24	(15.2)	3	(10.0)	52	(15.6)
	クラブ	49	(33.6)	56	(35.4)	11	(36.7)	116	(34.7)
	その他の場所で	12	(8.2)	10	(6.3)	2	(6.7)	24	(7.2)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	75	(51.4)	80	(50.6)	12	(40.0)	167	(50.0)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	路上	53	(16.9)	73	(15.7)	22	(15.4)	148	(16.1)
	居酒屋	44	(14.1)	54	(11.6)	15	(10.5)	113	(12.3)
	クラブ	73	(23.3)	101	(21.7)	29	(20.3)	203	(22.0)
	その他の場所で	23	(7.3)	28	(6.0)	11	(7.7)	62	(6.7)
	いずれの場所でも、そのような経験はない	182	(58.1)	276	(59.2)	83	(58.0)	541	(58.7)

表10. 強引にしたこと・されたこと(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■バーなどで、他人のお酒に睡眠薬など薬物を入れたことがありますか									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	ある	18	(10.8)	22	(7.1)	7	(6.2)	47	(8.0)
	ない	90	(53.9)	189	(61.4)	82	(72.6)	361	(61.4)
	覚えていない	57	(34.1)	94	(30.5)	23	(20.4)	174	(29.6)
	無回答	2	(1.2)	3	(1.0)	1	(0.9)	6	(1.0)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	ある	5	(3.4)	2	(1.3)	2	(6.7)	9	(2.7)
	ない	80	(54.8)	111	(70.3)	22	(73.3)	213	(63.8)
	覚えていない	59	(40.4)	40	(25.3)	6	(20.0)	105	(31.4)
	無回答	2	(1.4)	5	(3.2)	—	(0.0)	7	(2.1)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	ある	23	(7.3)	24	(5.2)	9	(6.3)	56	(6.1)
	ない	170	(54.3)	300	(64.4)	104	(72.7)	574	(62.3)
	覚えていない	116	(37.1)	134	(28.8)	29	(20.3)	279	(30.3)
	無回答	4	(1.3)	8	(1.7)	1	(0.7)	13	(1.4)
■バーなどで、自分のお酒に睡眠薬など薬物を入れたことがありますか									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	ある	15	(9.0)	24	(7.8)	7	(6.2)	46	(7.8)
	ない	93	(55.7)	190	(61.7)	83	(73.5)	366	(62.2)
	覚えていない	53	(31.7)	89	(28.9)	21	(18.6)	163	(27.7)
	無回答	6	(3.6)	5	(1.6)	2	(1.8)	13	(2.2)
②女性		n=146		n=158		n=30		n=334	
	ある	6	(4.1)	6	(3.8)	4	(13.3)	16	(4.8)
	ない	80	(54.8)	107	(67.7)	21	(70.0)	208	(62.3)
	覚えていない	58	(39.7)	41	(25.9)	5	(16.7)	104	(31.1)
	無回答	2	(1.4)	4	(2.5)	—	(0.0)	6	(1.8)
①+② 全体		n=313		n=466		n=143		n=922	
	ある	21	(6.7)	30	(6.4)	11	(7.7)	62	(6.7)
	ない	173	(55.3)	297	(63.7)	104	(72.7)	574	(62.3)
	覚えていない	111	(35.5)	130	(27.9)	26	(18.2)	267	(29.0)
	無回答	8	(2.6)	9	(1.9)	2	(1.4)	19	(2.1)

表11. マスターベーションのすることについて(年齢別)

		22歳以下		23歳～29歳		30歳以上		全体	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
■あなたの1週間あたりのマスターベーションの回数を教えてください ※男性の方のみ									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	ほぼ毎日	35	(21.0)	67	(21.8)	29	(25.7)	131	(22.3)
	週3～4回	31	(18.6)	54	(17.5)	15	(13.3)	100	(17.0)
	週1～2回	32	(19.2)	51	(16.6)	34	(30.1)	117	(19.9)
	月2～3回	9	(5.4)	27	(8.8)	8	(7.1)	44	(7.5)
	月1回	9	(5.4)	14	(4.5)	7	(6.2)	30	(5.1)
	数ヶ月に1回程度	7	(4.2)	17	(5.5)	5	(4.4)	29	(4.9)
	上記以外の回数	3	(1.8)	10	(3.2)	3	(2.7)	16	(2.7)
	一切しない	39	(23.4)	65	(21.1)	12	(10.6)	116	(19.7)
	無回答	2	(1.2)	3	(1.0)	—	(0.0)	5	(0.9)
■普段行うマスターベーションの方法を教えてください ※男性の方のみ									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	手を上下にさせ、ペニスを刺激する	93	(55.7)	185	(60.1)	86	(76.1)	364	(61.9)
	射精の直前に寸止めする	7	(4.2)	13	(4.2)	6	(5.3)	26	(4.4)
	脚(あし)をピン緊張させた状態で行う	18	(10.8)	12	(3.9)	4	(3.5)	34	(5.8)
	ローションを使用する(オナホールを使用する際のローションは除く)	5	(3.0)	15	(4.9)	2	(1.8)	22	(3.7)
	布団や畳、床などにこすりつける	5	(3.0)	9	(2.9)	4	(3.5)	18	(3.1)
	オナホールを使う	5	(3.0)	16	(5.2)	3	(2.7)	24	(4.1)
	その他	40	(24.0)	86	(27.9)	20	(17.7)	146	(24.8)
■マスターベーションのすることについて、気軽に相談出来る人はいますか？ ※男性の方のみ									
①男性		n=167		n=308		n=113		n=588	
	同性の友人	75	(44.9)	128	(41.6)	43	(38.1)	246	(41.8)
	恋人/配偶者	15	(9.0)	28	(9.1)	7	(6.2)	50	(8.5)
	学校/職場の同級生/同僚	15	(9.0)	20	(6.5)	4	(3.5)	39	(6.6)
	異性の友人	14	(8.4)	16	(5.2)	5	(4.4)	35	(6.0)
	同性の兄弟	7	(4.2)	14	(4.5)	3	(2.7)	24	(4.1)
	その他	6	(3.6)	18	(5.8)	8	(7.1)	32	(5.4)
	相談できる相手はいない	49	(29.3)	105	(34.1)	43	(38.1)	197	(33.5)