

厚生労働科学研究費補助金【エイズ対策政策研究事業】
HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究
(分担) 研究報告書

効果的な HIV 検査受検勧奨にかかる普及啓発の研究 (ハイリスク層)
-受検状況と受検関連意識調査-

研究分担者 本間 隆之 (山梨県立大学看護学部)
研究協力者 岩橋 恒太 (NPO 法人 akta)

研究要旨

本研究では、HIV 検査の受検状況とその課題を明らかにするため、特に首都圏の MSM (Men who have Sex with Men) および金銭を介した性交を行う男性・女性に焦点を当て、HIV 検査行動を分析した。目的: 全国の一般集団および首都圏の MSM および金銭を介した性交をする男女に関して HIV 検査受検状況を明らかにし、検査を阻害する要因と促進するための知見を得ることを目的とする。方法: 全国のインターネット調査パネルを用いて、HIV 検査の受検経験や未受検理由、性感染症罹患歴、予防行動、郵送検査の利用意向などを評価した。特に首都圏では、MSM、金銭を介した性交を行う男性・女性を対象にデータを収集し、分析を行った。調査は 2024 年 8 月に実施し、回答の整合性を確認するためのクリーニングを行った後、分析対象データを確定した。結果: 首都圏の MSM における HIV 検査の生涯受検割合は約 5 割であったが、過去 6 ヶ月以内の受検者は 2 割未満にとどまり、多くが 3 年以上受検していなかった。金銭を介した性交を行う男性・女性も同様に、定期的な検査が十分に行われていなかった。検査実施場所としては、保健所・保健センターの利用が最も多く、特に首都圏の MSM や金銭を介した性交を行う男性では約半数が利用していた。HIV 検査を受けない理由として、MSM の約 1 割は「ゲイであることを知られたくない」「知人に会うかもしれない」といった社会的スティグマを理由に検査を避けていた。郵送検査の利用は MSM で約 9%、金銭を介した性交を行う男性・女性でも一般集団より高く、利便性の高い検査に一定の需要がある。MSM の約半数は郵送検査の利用意向を示し、保健所でのキット受け取りを希望する人も 48%と多かった。考察: HIV 検査の受検割合は一定程度確保されているものの、リスクのある人における定期的な受検が進んでいない。保健所は依然として主要な検査機関であり、特に MSM や金銭を介した性交を行う男性にとって重要な役割を担っている。一方で、社会的スティグマが検査の障壁となる MSM に対しては、新宿東口検査・相談室のような専門施設の継続的な運用や郵送検査などの多様かつ信頼できる選択肢の提供が必要となる。

A. 研究目的

本研究では、男性と性行為を行う男性; Men who have sex with men (以下 MSM) に対する HIV 検査受検行動支援のために必要な課題の整理と検査環境整備への提言を目的として調査を行った。過去の厚生労働科学研究費補助金で行われた調査との比較可能性を検討しつつ、HIV 検査受検経験や予防行動を評価した。

B. 研究方法

1. 実施準備

1) 実施保健所との調整

インターネットマーケティングリサーチ会社に委託して調査を実施した。リサーチ会社に調査パネルとして登録している人に対して案内を送信。受信者の web 画面上で研究趣旨を説明の上、同意した人に対してオンライン質問票調査を行った。調査実施期間は 2024 年 8 月末。

調査対象者の設定

調査対象者は、全国のリサーチ会社の登録者とした。予算の都合から地域ブロックごとに登録制別(男性 or 女性)ごとの回収上限を設定した。首都

圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)については、過去の調査との比較可能性を担保するためにMSM、金銭を介した性交経験がある男性、金銭を介した性交経験がある女性の3つのカテゴリの回収数を別枠で設定した。そのため、首都圏については、上記3カテゴリの存在割合などを算出することはできない。

調査項目は、性別、年齢、居住地、職業、性感染症可能性の認知、性感染症罹患歴、HIV検査の受検経験、未受検理由、学習経験、性行動、PrEP利用経験、ヘルスリテラシー尺度(CCHL)、MSMに対して啓発の認知と性行動を質問した。MSMに対しては最大39問、それ以外は最大29問である。

サンプリングブロックごとに集計を行った。

倫理的配慮

本研究は調査会社に自ら登録している調査パネルに対して行うものであり、侵襲を伴わない連結不可能匿名化のデータを収集する横断調査である。本研究の研究計画については山梨県立大学看護学部研究倫理審査委員会の承認を受けたのち(承認番号 2024-11)、所属学部長の許可を得て実施した。

データのクリーニング

納品データは回答時間が著しく短い回答者を除外して納品されるが、「著しく短い」の定義はリサーチ会社の基準であり非公表となっている。

さらに、今回の調査において独自に回答者の質を評価するために、リサーチ会社による回答時間以外の納品前のクリーニングは行わず、全回答の納品を依頼した。納品回答は17,094件であった。これを用いて分析に供するデータのクリーニングを行った。クリーニングには回答の質の担保のため、あらかじめ同一のことを別の聞き方で訪ねる質問を準備し、回答の整合性を確認することで分析対象回答を絞り込んだ。

除外基準①「このアンケートへの回答が始めて

か」について「2回目以上」との回答を除外した。

除外基準②は、整合性確認として、「Q9 最近のHIV検査受検時期」と「Q28 過去6ヶ月のHIV検査受検経験」を別の設問として配置し、両設問の回答に齟齬があった場合にケースを分析対象から除外した。なお、Q9は「Q7.HIV検査の受検経験」に「ある」と回答した人にもみ提示した設問である。

除外基準③は、「自身が男性かつ男性との性交経験があると回答した人」にのみ提示した設問「Q34 男性との性交経験の有無」において「ない、あるいはわからない」と回答があった場合にケースを分析対象から除外した。

表1 データクリーニング

		除外基準③		合計
		データ使用	該当(除外)	
回答は始めて	除外基準②	データ使用	15349	622
	該当(除外)		158	
回答2回目以上(除外)	除外基準②	データ使用	874	52
	該当(除外)		13	
				17094

表2 ブロックごとの除外者数

	使用	除外	合計
首都圏:MSM	569	748	1317
首都圏:金銭を介した性交あり男性	899	54	953
首都圏:金銭を介した性交あり女性	308	21	329
北海道東北:一般男性	829	54	883
北海道東北:一般女性	866	51	917
首都圏:一般男性	925	53	978
首都圏:一般女性	1220	77	1297
関東甲信越(首都圏除く):一般男性	388	23	411
関東甲信越(首都圏除く):一般女性	399	28	427
北陸:一般男性	835	63	898
北陸:一般女性	824	58	882
東海:一般男性	848	45	893
東海:一般女性	830	53	883
近畿:一般男性	835	65	900
近畿:一般女性	846	59	905
中国四国:一般男性	829	59	888
中国四国:一般女性	844	68	912
九州:一般男性	551	48	599
九州:一般女性	578	37	615
沖縄:一般男性	606	53	659
沖縄:一般女性	520	28	548
合計	15349	1745	17094

なお、MSM で除外該当者が多いのは、MSM に関する設問で除外基準を作ったことによる。

C. 研究結果

除外基準①に該当したのは 940 件、除外基準②に該当したのは 700 件、除外基準③に該当したのは 197 件であった。これらのいずれかの除外基準に該当したのは 1,745 件であり、分析に供する有効回答は 15,349 件となった。

属性と性感染症罹患歴

個別のサンプリングを行った首都圏 MSM(n=596)では年齢の中央値 49 歳、50 歳代が 49%、生涯の性感染症罹患歴は 33%であった。性感染症の種類としてはクラミジア(12.7%)が最も多く、次いで梅毒(12%)、淋菌感染症(8.6%)であった。首都圏金銭を介した性交経験有りの女性(n=308)では、年齢の中央値 42 歳、性感染症の罹患経験は 36%、性感染症の種類はクラミジア(24.4%)、性器ヘルペス(8.1%)、淋菌感染症(6.8%)の順であった。他の地域ブロックにおいても、最も罹患歴の多い性感染症はクラミジア感染症であった。首都圏 MSM においては、過去 6 ヶ月間の性感染症罹患経験において最も多いのは梅毒となっていた。

過去 6 ヶ月以内に HIV 検査を勧められた経験については、MSM (3.9%) が最も高く、次いで金銭を介した性交を行う女性 (1.9%)、男性 (1.0%) が続いた。一般集団では 1%未満であり、多くの人が HIV 検査を推奨される機会がない。過去 1 年以内まで含めても、HIV 検査を勧められた経験がある割合は MSM (6.0%)、金銭を介した性交を行う女性 (3.8%)、男性 (1.4%) にとどまり、一般集団ではほぼゼロに近い値となった。首都圏 MSM と首都圏金銭を介した性交経験有りの女性で他と比べ高かった (表 3-1)。

HIV 検査行動

これまでの HIV 検査受検は、首都圏 MSM で 47.6%、首都圏金銭を介した性交経験有りの女性

で 36.4%と他の一般集団の平均(12.7%)よりも高かった。地域別では沖縄の一般女性 (20.6%) が最も高いものの、他の地域では 10%台であった。

HIV 検査を受けたことがある人に対して HIV 検査を受けた機会を複数回答でたずねたところ、最も多く利用された検査場所は「保健所・保健センター」であり、MSM (48.0%) や金銭を介した性交を行う男性 (44.6%) で特に高い割合を占めた。複数回答であるにも関わらず各ブロックとも一般女性では「妊娠時の検査」が最多であった。「病院や診療所」の検査も MSM や金銭を介した性交経験有りの女性で利用されていた。また、首都圏 MSM において「新宿東口検査・相談室 (南新宿検査・相談室)」の利用が比較的多い点であり、21.0%がこの施設で検査を受けたと回答していた。

郵送検査の利用は MSM の 8.9%、金銭を介した性交を行う男性 (8.6%)、女性 (8.9%) が郵送検査を利用した経験があり、一般住民に比べて利用率が高かった。

過去 6 ヶ月以内に HIV 検査を受けた割合は、MSM (18.5%) が最も高く、次いで金銭を介した性交を行う女性 (15.2%) であった。一般男性 (7.4%) や一般女性 (7.3%) ではさらに低かった。3 年以上前に受検したという回答が最も多かったのは一般男性 (75.3%)、一般女性 (83.0%) であり、検査を受ける頻度が非常に低い。MSM でも 55.0%が 3 年以上前に検査を受けたと回答した。

最近 HIV 検査を受けた場所について、MSM では「保健所・保健センター」が最多 (36.2%) であったが、新宿東口検査・相談室の利用も一定数 (12.9%) 見られた。

HIV 検査未受検者の理由

HIV 検査を受けたことがない、または 3 年以上受けていない人に未受検の理由を尋ねたところ、最も多かったのは「感染の可能性がないと思う」(66.9%~91.5%) であった。多くの人が自身で HIV 感染リスクを評価し、検査を受ける必要性を

感じていない。その他の理由としては、「保健所の検査時間が合わない」「検査場所が遠い」「知り合いに会うかもしれない」「ゲイであることを知られるのが嫌」などが挙げられた。特に MSM においては、「感染していたらどうしたらよいかかわらなくなるから」といった感染後の生活が見えないために結果を受け入れる準備ができていない可能性がある。また、「ゲイであることを知られるのが嫌」(6.0%)、「セクシュアリティや性行動について話したくない」(6.5%)といったスティグマに関連する回答が多かった。また、「お金がかかるから」(7.2%)、「どこで検査を受けられるかわからないから」(6.9%)といった理由も一定数見られ、特に金銭を介した性交を行う女性(10.0%)では「どこで検査を受けられるかわからない」という回答が高かった。(表 4-1, 4-2)

HIV 検査を受けることをためらった理由について尋ねたところ、MSM において「知人に会うかもしれない」(11.1%)、「HIV 検査を受けることを誰かに知られるかもしれない」(10.9%)、「ゲイであることを知られるかもしれない」(12.3%)といった懸念が一般男女と比べると高い割合で見られた。また、「自分の性行動について話したくない」という理由で検査をためらった MSM は 17.4%に上り、金銭を介した性交を行う女性(9.1%)や男性(6.9%)と比べても高かった。

郵送検査キット

「もし郵送検査キットがあったら、HIV の検査を受けようと思うか」について、MSM の 29.0%が「HIV の検査を受けようと思う」と回答し、さらに「HIV 以外の性感染症の検査も受けようと思う」(2.8%)、「HIV と性感染症の検査を受けようと思う」(25.1%)を含めると、MSM の約半数(54.1%)が郵送検査を前向きに捉えていた。これに対し、一般男女では「HIV の検査を受けようと思う」と回答した割合が低く、検査自体への関心の低さ、HIV 検査の必要性を感じていない結果となった。

郵送検査キットを保健所で受け取れるとした場合の意向を尋ねたところ、MSM では 24.1%が「そう思う」、23.4%が「ややそう思う」と回答し、約 47.5%が利用意向を示した。一方で、一般男性(4.1%)、一般女性(4.2%)の関心は低かった。検査意識の高い MSM に対して郵送検査の訴求力があることがわかった。

HIV 検査を受ける際、知人に会うことを懸念

「保健所や病院に行くと知人に会う可能性がある」と考えている人の割合は MSM (28.3%) が最も高く、次いで金銭を介した性交を行う女性(24.7%)が続いた。

HIV 予防行動 (表 6-1, 6-2)

過去 6 ヶ月間の性交渉経験について、MSM では「0 人(性交渉なし)」が 34.8%、「1 人」が 25.7%、

「2～9 人」が 30.4%であった。金銭を介した性交を行う男性・女性では、2～9 人と回答した割合がそれぞれ 18.8%、14.9%と比較的高かった。過去 6 ヶ月間に性交渉を行った人のうち、コンドームを「必ず毎回使った」と回答した割合は、MSM (22.1%)、金銭を介した性交を行う男性(35.5%)、女性(24.6%)であった。一方で、「全く使わなかった」と回答した割合は、MSM (39.1%) が最も高く、金銭を介した性交を行う男性(38.3%)、女性(38.9%)でも高かった。一般男女ではコンドームを全く使わなかった割合がさらに高く、特に一般女性(44.8%)では半数近くがコンドームを使用していなかった。他の集団においてはほとんど 0%に近いのに対して、MSM においては PrEP の利用が 4.9%ほど見られた。多様な予防方法を選択している割合は MSM で多かった。

HIV 予防薬 PrEP (プレップ) について、「聞いたことがある」と回答した割合は MSM (44.5%) が最も高かったが、それでも半数以上は認知していなかった。金銭を介した性交を行う男性(8.7%)、女性(12.3%)では認知率がさらに低く、一般住民ではほぼ知られていない状況であった(一般男性 3.4%、一般女性 1.7%)。

PrEP の利用経験について尋ねたところ、MSM では「過去に利用したことがある」(5.1%)、「個人輸入してデイリーで利用している」(1.9%)、「個人輸入してオンデマンドで利用している」(4.5%)、「クリニックで購入しデイリーで利用している」(1.9%)、「クリニックで購入しオンデマンドで利用している」(3.8%) と、合計 17.2%が何らかの形で PrEP に関する経験があると回答した。

PrEP 利用の課題として、「価格が高い」(37.8%)、「薬の入手が困難」(26.9%)、「正しい使い方がわからない」(13.5%)、「自分が使うべきかわからない」(16.0%) といった回答が挙げられた。特に、MSM の中でも PrEP の存在を知っていても、実際に利用するまでのハードルが高いことが示された。

D. 考察

本研究では、日本国内における HIV 検査の受検状況とその課題について、特に MSM (Men who have Sex with Men) および金銭を介した性交を行う男性・女性に焦点を当てて分析を行った。これらの集団において、検査を受ける上での社会的・心理的障壁が依然として存在することが示唆された。

1. HIV 検査の受検割合と頻度

本調査では、MSM の HIV 検査生涯受検割合は 47.6%であり、金銭を介した性交を行う女性 (36.4%) や首都圏男性 (15.5%) と比較すると高かった。さらに、直近の受検時期では、MSM の 55.0%、金銭を介した性交を行う男性 (69.1%)、首都圏女性 (58.0%) が「3 年以上前」と回答しており、個々のリスクの状況にもよるが、定期的な検査が行われていない。HIV 感染予防の観点からは、少なくとも年 1 回、リスクの高い行動を取る場合は 3~6 ヶ月に 1 回の検査が推奨されるが、本調査では、過去 6 ヶ月以内に HIV 検査を受けた割合は MSM で 18.5%、金銭を介した性交を行う女性で 15.2%、男性で 12.2%にとどまり、コンビネーション予防における定期的な受検の観点をさらに啓発していく必要がある。

2. HIV 検査の実施場所と選択要因

HIV 検査を受けた経験がある対象者において、

最も利用されている検査場所は「保健所・保健センター」であり、MSM (48.0%)、金銭を介した性交を行う男性 (44.6%)、女性 (27.7%) での利用率が高かった。依然として無料匿名かつ信頼できる検査施設である保健所は検査機会の提供に最も重要な役割を果たしており、保健所の検査の利便性向上が検査機会向上につながる。

検査を受けない理由として MSM に特有の理由として、「ゲイであることを知られるのが怖い」

(6.0%)、「セクシュアリティや性行動について話したくない」(6.5%) といった社会的スティグマに関連する回答が一定数見られた。金銭を介した性交を行う女性でも「セクシュアリティや性行動について話したくない」(9.1%) という回答があり、性的指向や職業的背景を理由に検査をためらう傾向があった。さらに、「お金がかかるから」

(MSM 7.2%、金銭を介した性交を行う女性 8.4%)、「どこで検査を受けられるかわからない」

(MSM 6.9%、金銭を介した性交を行う女性 10.0%) といった回答も一定数あることから、保健所や検査提供施設に於いて、セクシュアリティや性行動に対して理解のある対応ができるよう、検査提供者の資質向上に務めると共に、保健所問うでは支援的に受け入れていることを受検希望者に伝えるための啓発 (アウトリーチ) も必要となる。

郵送検査

HIV 検査をためらう理由として、「知人に会うかもしれない」(MSM 11.1%)、「HIV 検査を受けることを誰かに知られるかもしれない」(10.9%) といったプライバシーの問題が挙げられた。このことから、保健所や病院での対面検査ではなく、郵送検査の活用がプライバシーを気にする層にとって有効な選択肢となりうる。郵送検査に関する利用の意向を尋ねた結果、MSM の 54.1%が「HIV の検査を受けようと思う」と回答しており、保健所で郵送検査キットを受け取れる場合には 47.5%が利用を希望していた。実際に、郵送検査の利用割合は MSM で 8.9%、金銭を介した性交を行う男性 (8.6%)、女性 (8.9%) と、一般男女と比べて高い。2021 年度の厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業「HIV 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究」において実施した同様の首都圏 MSM に対する調査では約 4%で

あったのに対しておおよそ倍になっている。HIV 感染リスクが高い集団に於いてはより利便性を求めて時間や場所にとらわれない郵送検査が選択肢となっているようである。手軽であるがゆえに結果の理解や、郵送検査で陽性の結果が得られた場合の対応など、個人の健康管理としての検査として環境や体制の整備が必要となる。

E. 結論

本研究では、日本国内における HIV 検査の受検状況とその課題について、特に MSM (Men who have Sex with Men) および金銭を介した性交を行う男性・女性に焦点を当てて分析を行った。その結果、これらの集団においては HIV 検査の受検割合が一定程度確保されているものの、定期的な受検が十分に行われていない。また、検査を受ける際の社会的・心理的な障壁が依然として存在し、検査の選択肢や提供体制の見直しが必要であることが示唆された。

HIV 検査の受検状況と課題

HIV 検査を受けた経験がある人は一定数いるものの、直近の受検時期が数年前に遡るケースが多く、定期的な受検が十分に行われていないことが分かった。特に、リスクの高い行動を取る人々の中でも、継続的に検査を受けている人は限られており、定期受検の重要性についてさらに啓発を進める必要がある。HIV 感染予防の観点からは、状況に応じた受検の頻度が推奨されているが、多くの人にとって、検査を受ける機会を確保することより容易に手軽にする必要がある。

HIV 検査を受ける場所としては、保健所・保健センターが最も多く利用されていた。無料・匿名で専門家が介することが、安心や信頼して検査を受ける上での重要な要因となっている。一方で、保健所の検査時間や予約の必要性、アクセスのしにくさを理由に検査機会を逃している人も一定数存在し、検査をより受けやすくするための利便性向上が求められる。

社会的・心理的障壁と情報不足

HIV 検査の受検をためらう理由として、プライバシーの懸念や社会的スティグマの存在が指摘された。特に、MSM においては、周囲にゲイであることを知られることへの不安や、セクシュアリティについて話すことに抵抗を感じることも、検査を受ける上での障壁となっていた。同様に、金銭を介した性交を行う人々の中にも、性行動について知られることを避けるために検査を受けない人が一定数いた。また、検査を受けることができる場所や手段について十分な情報を持っていない人も多く、どこで検査を受けられるのか分からないという理由で検査を受けていないケースも見られた。HIV 検査に関する情報が広く行き渡っていないことが、受検割合を低くする一因となっており、検査に関する正しい知識を提供することが重要である。

郵送検査の活用と課題

HIV 検査を受ける際に、知人に会うことや検査を受けていることが周囲に知られることへの不安を感じる人が多いことから、対面での検査に代わる手段として郵送検査の利用が進んでいる。郵送検査は、時間や場所にとらわれずに自宅で検査を行えるため、特にプライバシーを重視する人々にとって有効な選択肢となっている。

実際に郵送検査を利用した人も一定数おり、今後さらに普及していく可能性がある。一方で、郵送検査は手軽に利用できる利点がある反面、結果の解釈や陽性時の対応が個人に委ねられる側面があるため、検査後のフォローアップ体制を強化することが求められる。郵送検査を受けた人が、必要に応じて速やかに医療機関や支援機関につながるようなサポート体制を整備することが、今後の課題となる。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

(発表雑誌名巻号・頁・発行年なども記入)

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

- ・木南 拓也, 本間隆之, 藤原 孝大, 岩橋 恒太.
コミュニティセンターaktaにおける、来場者
数についての考察. 日本エイズ学会学術集会.
2024 年 12 月.(東京)
- ・高久道子, 岩橋恒太, 金子典代, 荒木順, 木南

拓也, 高野操, 本間隆之, 生島嗣. コミュニティ
センターakta に郵送検査キットを受け取りに
来た外国籍 MSM の検査行動の把握. 日本エイ
ズ学会学術集会. 2024 年 12 月.(東京)

- ・小川夏実, 本間隆之. 個人輸入代行を利用する
PrEP ユーザーによるレビューからみる PrEP
の状況. 日本エイズ学会学術集会. 2024 年 12
月.(東京)

H. 知的所有権の出願・登録状況 (予定を含む)

なし

表 3-1. 集団別,地域別の属性

	首都圏:MSM (n=569)	首都圏:男性 (金銭を 介した性交 あり) (n=899)	首都圏:女性 (金銭を 介した性交 あり) (n=308)	首都圏:一 般男性 (n=925)	首都圏:一 般女性 (n=1220)	北海道東 北:一般男 性 (n=829)	北海道東 北:一般女 性 (n=866)	関東甲信越 (首都圏除): 一般男性 (n=388)	関東甲信越 (首都圏除): 一般女性 (n=399)	北陸:一般 男性 (n=835)	北陸:一般女 性 (n=824)
年齢10歳階級											
29歳以下	(4.4%)	(1.7%)	(9.7%)	(2.2%)	(7.5%)	(2.2%)	(8.1%)	(1.3%)	(6.5%)	(3.0%)	(8.1%)
30歳代	(14.9%)	(8.2%)	(30.5%)	(7.2%)	(20.3%)	(10.7%)	(22.2%)	(11.3%)	(23.3%)	(10.1%)	(22.5%)
40歳代	(31.8%)	(30.1%)	(35.4%)	(32.9%)	(30.8%)	(32.9%)	(36.6%)	(33.2%)	(36.1%)	(30.5%)	(34.0%)
50歳代	(48.9%)	(60.0%)	(24.4%)	(57.7%)	(41.3%)	(54.2%)	(33.1%)	(54.1%)	(34.1%)	(56.4%)	(35.4%)
Q1 セクシュアリティ											
異性愛者 (ヘテロセクシュアル)	(27.2%)	(96.0%)	(79.5%)	(94.3%)	(89.8%)	(93.0%)	(88.9%)	(91.8%)	(88.5%)	(93.4%)	(90.4%)
同性愛者 (ゲイ・レズビアン)	(34.8%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.3%)	(0.7%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.3%)	(0.2%)	(0.8%)
両性愛者 (バイセクシュアル)	(29.9%)	(0.4%)	(8.8%)	(0.4%)	(1.1%)	(1.4%)	(1.6%)	(1.5%)	(1.3%)	(1.0%)	(1.3%)
その他、きめたくない、わからない	(8.1%)	(3.6%)	(11.0%)	(5.2%)	(8.8%)	(4.8%)	(9.1%)	(6.2%)	(10.0%)	(5.4%)	(7.4%)
Q2 職業											
正規雇用	(66.6%)	(74.0%)	(35.7%)	(69.2%)	(38.8%)	(74.8%)	(35.9%)	(82.2%)	(34.6%)	(77.2%)	(45.6%)
非正規雇用 (パートアルバイト、契約社員)	(12.5%)	(8.0%)	(34.1%)	(8.5%)	(32.8%)	(9.0%)	(35.6%)	(4.6%)	(38.3%)	(7.1%)	(34.6%)
自由業・自営業・経営	(12.1%)	(11.6%)	(5.8%)	(13.5%)	(4.7%)	(9.3%)	(4.4%)	(7.5%)	(5.3%)	(10.5%)	(4.1%)
学生	(0.2%)	(0.1%)	(1.0%)	(0.4%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.6%)	(0.6%)
働いていない	(7.4%)	(5.8%)	(21.4%)	(7.5%)	(21.5%)	(5.8%)	(21.0%)	(5.4%)	(19.8%)	(4.3%)	(14.7%)
その他	(1.2%)	(0.6%)	(1.9%)	(0.9%)	(1.7%)	(0.8%)	(2.2%)	(0.3%)	(1.5%)	(0.2%)	(0.4%)
Q3 性感染症感染可能性											
高いかもしれないと思う	(3.9%)	(1.4%)	(3.2%)	(0.3%)	(0.1%)	(1.0%)	(0.5%)	(2.1%)	(1.3%)	(0.7%)	(0.6%)
五分五分くらいだと思う	(7.9%)	(3.3%)	(6.2%)	(1.7%)	(1.6%)	(2.9%)	(1.8%)	(2.6%)	(1.5%)	(2.2%)	(2.1%)
低いと思う	(74.7%)	(86.5%)	(82.8%)	(88.0%)	(90.6%)	(87.3%)	(88.8%)	(85.3%)	(90.2%)	(88.5%)	(91.3%)
わからない	(10.4%)	(8.1%)	(6.8%)	(9.4%)	(7.2%)	(8.6%)	(8.1%)	(9.8%)	(6.5%)	(8.0%)	(5.9%)
今すでに感染の診断を受けている	(3.2%)	(0.6%)	(1.0%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.2%)	(0.8%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.6%)	(0.1%)
Q4 生涯の性感染症罹患											
梅毒	(12.0%)	(1.9%)	(3.2%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.2%)	(1.3%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.4%)
A型肝炎	(1.6%)	(0.1%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)
B型肝炎	(4.6%)	(0.6%)	(1.0%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.8%)	(0.7%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.2%)
C型肝炎	(1.4%)	(0.4%)	(0.6%)	(0.9%)	(0.2%)	(0.4%)	(0.1%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)
HIV感染症	(5.3%)	(0.2%)	(1.0%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.2%)
淋菌	(8.6%)	(4.6%)	(6.8%)	(1.0%)	(0.4%)	(2.2%)	(0.5%)	(2.8%)	(0.8%)	(2.6%)	(0.8%)
クラミジア	(12.7%)	(8.5%)	(24.4%)	(2.2%)	(6.7%)	(4.5%)	(9.2%)	(6.4%)	(11.3%)	(5.1%)	(10.9%)
尖圭コンジローマ	(4.7%)	(1.8%)	(4.5%)	(0.2%)	(0.3%)	(1.2%)	(1.5%)	(1.3%)	(0.8%)	(1.1%)	(0.6%)
性器ヘルペス	(4.9%)	(2.9%)	(8.1%)	(0.4%)	(1.0%)	(1.7%)	(3.0%)	(1.3%)	(2.5%)	(1.1%)	(0.8%)
その他	(1.4%)	(0.2%)	(1.6%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.7%)	(1.3%)	(0.3%)	(1.3%)	(0.2%)	(0.6%)
いずれもない	(66.4%)	(83.2%)	(64.0%)	(95.0%)	(91.3%)	(89.7%)	(85.7%)	(88.7%)	(85.0%)	(89.8%)	(87.0%)
Q5 過去6ヶ月の性感染症罹患											
梅毒	(6.3%)	(2.6%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)
A型肝炎	(1.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)
B型肝炎	(1.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.5%)	(2.4%)	(6.8%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.9%)
C型肝炎	(0.5%)	(0.0%)	(0.9%)	(2.2%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
HIV感染症	(4.2%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
淋菌	(3.1%)	(1.3%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)	(4.5%)	(0.0%)	(2.4%)	(0.0%)
クラミジア	(6.3%)	(6.0%)	(7.2%)	(4.3%)	(5.7%)	(2.4%)	(0.8%)	(9.1%)	(8.3%)	(3.5%)	(3.7%)
尖圭コンジローマ	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(2.3%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)
性器ヘルペス	(1.0%)	(4.6%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.9%)	(1.2%)	(2.4%)	(0.0%)	(5.0%)	(2.4%)	(0.0%)
その他：{FA}	(1.0%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.2%)	(0.0%)	(5.0%)	(1.2%)	(0.0%)
いずれもない	(81.2%)	(86.1%)	(87.4%)	(93.5%)	(93.4%)	(87.1%)	(90.3%)	(81.8%)	(81.7%)	(87.1%)	(95.3%)
Q6 HIV検査を勧められた経験											
過去6ヵ月以内にある	(3.9%)	(1.0%)	(1.9%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.6%)	(0.6%)	(1.3%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.0%)
過去1年以内にある	(2.1%)	(0.4%)	(1.9%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.5%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.6%)
過去1年から2年以内にある	(1.4%)	(0.2%)	(2.6%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.1%)	(0.5%)	(0.8%)	(0.1%)	(0.2%)
2年より以前にある	(12.5%)	(4.7%)	(7.5%)	(1.5%)	(1.4%)	(2.3%)	(2.0%)	(1.5%)	(2.5%)	(1.6%)	(1.1%)
ない	(80.1%)	(93.7%)	(86.0%)	(97.5%)	(98.2%)	(96.4%)	(97.1%)	(96.6%)	(96.5%)	(97.4%)	(98.1%)

表 3-2. 集団別,地域別の属性(続き)

	東海:一般男 性	東海:一般女 性	近畿:一般男 性	近畿:一般女 性	中国四国:一 般男性	中国四国:一 般女性	九州:一般男 性	九州:一般女 性	沖縄:一般男 性	沖縄:一般女 性
	(n=848)	(n=830)	(n=835)	(n=846)	(n=829)	(n=844)	(n=551)	(n=578)	(n=606)	(n=520)
年齢10歳階級										
29歳以下	(2.7%)	(7.5%)	(0.8%)	(8.3%)	(1.8%)	(8.2%)	(2.7%)	(8.8%)	(2.8%)	(10.4%)
30歳代	(11.0%)	(20.8%)	(9.1%)	(21.2%)	(12.4%)	(23.6%)	(11.8%)	(26.5%)	(17.8%)	(25.8%)
40歳代	(33.4%)	(32.7%)	(29.9%)	(29.9%)	(34.1%)	(33.3%)	(33.4%)	(30.3%)	(35.6%)	(33.8%)
50歳代	(52.9%)	(39.0%)	(60.1%)	(40.7%)	(51.6%)	(35.0%)	(52.1%)	(34.4%)	(43.7%)	(30.0%)
Q1 セクシュアリティ										
異性愛者 (ヘテロセクシュアル)	(92.5%)	(89.5%)	(91.9%)	(88.9%)	(92.2%)	(89.7%)	(92.2%)	(88.8%)	(90.8%)	(87.7%)
同性愛者 (ゲイ・レズビアン)	(0.9%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.4%)	(1.4%)	(0.5%)	(0.9%)	(0.7%)	(3.1%)	(0.6%)
両性愛者 (バイセクシュアル)	(0.9%)	(1.1%)	(2.2%)	(2.0%)	(1.0%)	(1.3%)	(1.1%)	(1.2%)	(1.3%)	(2.5%)
その他、きめたくない、わからない	(5.7%)	(8.7%)	(5.3%)	(8.7%)	(5.4%)	(8.5%)	(5.8%)	(9.3%)	(4.8%)	(9.2%)
Q2 職業										
正規雇用	(78.8%)	(33.6%)	(73.3%)	(31.3%)	(76.1%)	(36.1%)	(73.1%)	(37.7%)	(69.1%)	(37.5%)
非正規雇用 (パートアルバイト、契約社員)	(6.7%)	(37.2%)	(6.5%)	(36.5%)	(7.7%)	(34.2%)	(7.8%)	(37.5%)	(11.9%)	(37.9%)
自由業・自営業・経営	(8.8%)	(5.1%)	(14.4%)	(6.1%)	(10.9%)	(5.8%)	(12.7%)	(5.2%)	(12.2%)	(7.3%)
学生	(0.0%)	(0.5%)	(0.4%)	(0.8%)	(0.1%)	(0.6%)	(0.9%)	(0.7%)	(0.3%)	(0.4%)
働いていない	(5.4%)	(22.2%)	(4.7%)	(23.9%)	(4.8%)	(21.0%)	(5.1%)	(16.8%)	(5.0%)	(15.0%)
その他	(0.2%)	(1.4%)	(0.8%)	(1.3%)	(0.4%)	(2.3%)	(0.4%)	(2.1%)	(1.5%)	(1.9%)
Q3 性感染症感染可能性										
高いかもしれないと思う	(0.7%)	(0.4%)	(1.1%)	(0.6%)	(0.6%)	(1.1%)	(0.4%)	(0.5%)	(1.3%)	(0.6%)
五分五分くらいだと思う	(1.2%)	(1.9%)	(2.8%)	(1.5%)	(1.6%)	(2.4%)	(1.8%)	(2.4%)	(1.3%)	(2.1%)
低いと思う	(88.6%)	(89.0%)	(87.9%)	(90.4%)	(88.3%)	(88.4%)	(85.5%)	(89.4%)	(89.9%)	(90.4%)
わからない	(8.8%)	(8.0%)	(8.0%)	(6.7%)	(9.0%)	(7.8%)	(11.4%)	(6.9%)	(7.3%)	(6.3%)
今すでに感染の診断を受けている	(0.7%)	(0.7%)	(0.2%)	(0.7%)	(0.5%)	(0.4%)	(0.9%)	(0.7%)	(0.2%)	(0.6%)
Q4 生涯の性感染症罹患										
梅毒	(1.1%)	(0.1%)	(1.6%)	(0.7%)	(1.0%)	(0.2%)	(0.7%)	(0.2%)	(1.8%)	(0.0%)
A型肝炎	(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
B型肝炎	(0.8%)	(0.2%)	(0.8%)	(0.5%)	(0.7%)	(1.1%)	(0.7%)	(0.2%)	(0.5%)	(0.2%)
C型肝炎	(0.4%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.4%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.3%)	(0.0%)
HIV感染症	(0.6%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.4%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)
淋菌	(3.7%)	(0.5%)	(3.1%)	(0.6%)	(2.2%)	(0.5%)	(5.6%)	(0.2%)	(2.5%)	(0.8%)
クラミジア	(4.4%)	(8.4%)	(4.9%)	(8.2%)	(5.8%)	(9.8%)	(6.7%)	(10.4%)	(5.9%)	(14.2%)
尖圭コンジローマ	(0.8%)	(0.8%)	(1.3%)	(1.2%)	(1.2%)	(0.9%)	(1.3%)	(0.7%)	(1.7%)	(0.8%)
性器ヘルペス	(0.8%)	(2.5%)	(1.4%)	(2.4%)	(1.7%)	(1.8%)	(2.0%)	(2.6%)	(1.5%)	(2.3%)
その他	(0.6%)	(0.7%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.7%)	(1.7%)	(0.2%)	(1.0%)
いずれもない	(89.4%)	(88.2%)	(89.0%)	(88.1%)	(89.3%)	(85.8%)	(85.5%)	(85.3%)	(88.8%)	(83.1%)
Q5 過去6ヶ月の性感染症罹患										
梅毒	(0.0%)	(1.0%)	(4.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(1.2%)	(2.9%)	(0.0%)
A型肝炎	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
B型肝炎	(3.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(3.4%)	(1.7%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
C型肝炎	(1.1%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
HIV感染症	(3.3%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)
淋菌	(2.2%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(1.5%)	(0.0%)
クラミジア	(5.6%)	(6.1%)	(5.4%)	(5.0%)	(1.1%)	(4.2%)	(3.8%)	(2.4%)	(4.4%)	(5.7%)
尖圭コンジローマ	(1.1%)	(1.0%)	(3.3%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)
性器ヘルペス	(1.1%)	(1.0%)	(2.2%)	(3.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(2.5%)	(7.1%)	(2.9%)	(1.1%)
その他: {FA}	(0.0%)	(2.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(0.0%)	(3.5%)	(0.0%)	(2.3%)
いずれもない	(85.6%)	(88.8%)	(87.0%)	(91.1%)	(87.6%)	(92.5%)	(90.0%)	(85.9%)	(88.2%)	(90.9%)
Q6 HIV検査を勧められた経験										
過去6か月以内にある	(0.2%)	(0.2%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.5%)	(0.4%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.2%)
過去1年以内にある	(0.0%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.5%)	(0.1%)	(0.5%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.4%)
過去1年から2年以内にある	(0.2%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.1%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.8%)	(0.6%)
2年より以前にある	(3.3%)	(1.1%)	(2.3%)	(2.0%)	(1.7%)	(1.7%)	(2.2%)	(1.9%)	(2.6%)	(2.9%)
ない	(96.2%)	(98.2%)	(96.6%)	(97.0%)	(97.3%)	(97.3%)	(96.9%)	(96.7%)	(96.0%)	(96.0%)

表 4-1. 集団別,地域別の HIV 検査行動

	首都圏:MSM (n=569)	首都圏:男性 (金銭を 介した性交 あり) (n=899)	首都圏:女性 (金銭を 介した性交 あり) (n=308)	首都圏:一 般男性 (n=925)	首都圏:一 般女性 (n=1220)	北海道東 北:一般男 性 (n=829)	北海道東 北:一般女 性 (n=866)	関東甲信越 (首都圏除): 一般男性 (n=388)	関東甲信越 (首都圏除): 一般女性 (n=399)	北陸:一般 男性 (n=835)	北陸:一般女 性 (n=824)
Q7 HIV検査を受けたこと											
ある	(47.6%)	(15.5%)	(36.4%)	(8.8%)	(13.5%)	(9.5%)	(14.0%)	(11.1%)	(19.0%)	(7.7%)	(14.6%)
ない	(52.4%)	(84.5%)	(63.6%)	(91.2%)	(86.5%)	(90.5%)	(86.0%)	(88.9%)	(81.0%)	(92.3%)	(85.4%)
受検経験ありのうち_HIV検査場所(これまで)											
保健所・保健センター	(48.0%)	(44.6%)	(27.7%)	(30.9%)	(21.2%)	(55.7%)	(8.3%)	(46.5%)	(13.2%)	(48.4%)	(21.7%)
新宿東口検査・相談室(南新宿検査・相談室)	(21.0%)	(9.4%)	(8.9%)	(6.2%)	(4.8%)	(1.3%)	(0.8%)	(4.7%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.8%)
入院時や手術前に行く、病院の検査	(17.0%)	(19.4%)	(17.0%)	(23.5%)	(15.8%)	(12.7%)	(15.7%)	(14.0%)	(14.5%)	(12.5%)	(10.0%)
手術や入院時以外の病院や診療所の検査	(20.3%)	(15.8%)	(24.1%)	(18.5%)	(7.3%)	(15.2%)	(16.5%)	(16.3%)	(11.8%)	(10.9%)	(5.8%)
妊娠時の検査(妊婦健診)	(2.2%)	(2.2%)	(25.9%)	(3.7%)	(49.7%)	(1.3%)	(62.8%)	(4.7%)	(51.3%)	(3.1%)	(60.0%)
イベントHIV検査会	(10.7%)	(0.7%)	(1.8%)	(1.2%)	(0.6%)	(1.3%)	(1.7%)	(7.0%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.8%)
郵送検査	(8.9%)	(8.6%)	(8.9%)	(2.5%)	(0.0%)	(6.3%)	(0.8%)	(9.3%)	(2.6%)	(9.4%)	(1.7%)
個人輸入した、自己判定検査キット	(3.0%)	(1.4%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(7.0%)	(2.6%)	(0.0%)	(1.7%)
国立国際医療研究センターのSH外来	(3.0%)	(2.2%)	(1.8%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.8%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
職場等の健康診断のオプション	(3.7%)	(5.8%)	(2.7%)	(9.9%)	(5.5%)	(7.6%)	(1.7%)	(9.3%)	(2.6%)	(7.8%)	(5.0%)
献血	(5.5%)	(6.5%)	(9.8%)	(7.4%)	(4.2%)	(5.1%)	(5.0%)	(11.6%)	(5.3%)	(4.7%)	(4.2%)
その他	(3.3%)	(3.6%)	(5.4%)	(1.2%)	(3.0%)	(2.5%)	(1.7%)	(4.7%)	(5.3%)	(4.7%)	(1.7%)
受検経験ありのうち_一番最近にHIV検査を受けたとき											
過去6か月以内	(18.5%)	(12.2%)	(15.2%)	(7.4%)	(7.3%)	(7.6%)	(9.1%)	(9.3%)	(3.9%)	(9.4%)	(3.3%)
過去1年以内	(9.2%)	(2.9%)	(10.7%)	(1.2%)	(3.6%)	(1.3%)	(5.8%)	(9.3%)	(9.2%)	(10.9%)	(13.3%)
過去1年から3年以内	(17.3%)	(15.8%)	(16.1%)	(16.0%)	(6.1%)	(17.7%)	(10.7%)	(7.0%)	(14.5%)	(4.7%)	(6.7%)
3年より以前	(55.0%)	(69.1%)	(58.0%)	(75.3%)	(83.0%)	(73.4%)	(74.4%)	(74.4%)	(72.4%)	(75.0%)	(76.7%)
受検経験ありのうち_一番最近に受けたHIV検査の種類											
保健所・保健センター	(36.2%)	(40.3%)	(24.1%)	(28.4%)	(18.2%)	(51.9%)	(7.4%)	(46.5%)	(11.8%)	(43.8%)	(18.3%)
新宿東口検査・相談室(南新宿検査・相談室)	(12.9%)	(9.4%)	(7.1%)	(6.2%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.8%)	(2.3%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.8%)
入院時や手術前に行く、病院の検査	(11.8%)	(14.4%)	(13.4%)	(23.5%)	(12.7%)	(12.7%)	(12.4%)	(9.3%)	(14.5%)	(12.5%)	(9.2%)
(手術や入院時以外の)病院や診療所の検査	(17.0%)	(15.1%)	(16.1%)	(17.3%)	(5.5%)	(15.2%)	(13.2%)	(11.6%)	(9.2%)	(9.4%)	(5.0%)
妊娠時の検査(妊婦健診)	(0.7%)	(1.4%)	(19.6%)	(2.5%)	(46.7%)	(1.3%)	(57.9%)	(0.0%)	(48.7%)	(3.1%)	(55.0%)
イベントHIV検査会	(5.2%)	(0.7%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.6%)	(1.3%)	(1.7%)	(2.3%)	(0.0%)	(4.7%)	(0.0%)
郵送検査	(4.8%)	(5.0%)	(3.6%)	(1.2%)	(0.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(7.0%)	(2.6%)	(9.4%)	(1.7%)
個人輸入した、自己判定検査キット	(1.1%)	(0.0%)	(1.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.3%)	(2.6%)	(0.0%)	(1.7%)
国立国際医療研究センターのSH外来	(2.2%)	(0.7%)	(0.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
職場等の健康診断のオプション	(2.2%)	(5.8%)	(1.8%)	(9.9%)	(4.8%)	(6.3%)	(1.7%)	(7.0%)	(2.6%)	(7.8%)	(5.0%)
献血	(3.0%)	(4.3%)	(7.1%)	(6.2%)	(4.2%)	(5.1%)	(3.3%)	(7.0%)	(2.6%)	(4.7%)	(1.7%)
その他	(3.0%)	(2.9%)	(5.4%)	(1.2%)	(3.0%)	(2.5%)	(1.7%)	(4.7%)	(3.9%)	(4.7%)	(1.7%)
受検経験なしまたは受検が3年以上前の人の内_未受検理由											
保健所の検査実施の時間が都合にあわないから	(5.8%)	(1.8%)	(3.1%)	(0.9%)	(1.0%)	(2.0%)	(1.2%)	(3.2%)	(1.3%)	(2.7%)	(0.9%)
保健所の場所が遠いから	(3.6%)	(1.3%)	(1.9%)	(0.7%)	(0.3%)	(1.4%)	(0.5%)	(1.6%)	(0.8%)	(1.0%)	(0.5%)
知り合いに会うかもしれないから	(2.7%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.1%)	(0.9%)	(0.8%)	(1.1%)	(0.3%)	(0.6%)	(0.1%)
検査を受けることを誰かに知られるかもしれないから	(3.6%)	(1.4%)	(2.3%)	(0.4%)	(0.6%)	(1.0%)	(0.8%)	(1.3%)	(0.8%)	(1.2%)	(0.3%)
ゲイであると思われるから	(6.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)
セクシュアリティや性行動について話したくないから	(6.5%)	(1.1%)	(1.1%)	(0.4%)	(0.3%)	(1.9%)	(0.7%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.9%)	(0.4%)
もし感染していたら、どうしていいかわからなくなるから	(8.5%)	(2.0%)	(2.7%)	(0.9%)	(1.0%)	(2.1%)	(2.0%)	(1.3%)	(1.6%)	(2.1%)	(1.1%)
そのうち症状が出るなどしてわかるかと思うから	(3.1%)	(1.6%)	(2.3%)	(0.6%)	(1.5%)	(2.1%)	(0.7%)	(1.1%)	(1.1%)	(1.2%)	(1.3%)
お金がかかるから	(7.2%)	(6.4%)	(8.4%)	(5.5%)	(3.4%)	(4.6%)	(4.3%)	(4.5%)	(4.2%)	(4.6%)	(4.9%)
どこで検査を受けられるかわからないから	(6.9%)	(6.1%)	(10.0%)	(3.8%)	(6.0%)	(5.3%)	(6.2%)	(5.0%)	(6.1%)	(5.6%)	(7.3%)
感染している可能性が無いと思うから	(66.9%)	(85.6%)	(77.8%)	(91.5%)	(88.9%)	(87.1%)	(88.6%)	(85.9%)	(88.6%)	(87.5%)	(87.4%)
前に受けたから	(7.6%)	(3.0%)	(7.3%)	(1.9%)	(3.5%)	(2.8%)	(2.8%)	(3.2%)	(4.2%)	(2.2%)	(4.1%)
その他	(4.7%)	(2.2%)	(2.7%)	(2.1%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.6%)	(1.9%)	(1.3%)	(1.3%)	(1.5%)

表 4-2. 集団別,地域別の HIV 検査行動 (続き)

	東海:一般男 性 (n=848)	東海:一般女 性 (n=830)	近畿:一般男 性 (n=835)	近畿:一般女 性 (n=846)	中国四国:一 般男性 (n=829)	中国四国:一 般女性 (n=844)	九州:一般男 性 (n=551)	九州:一般女 性 (n=578)	沖縄:一般男 性 (n=606)	沖縄:一般女 性 (n=520)
Q7 HIV検査を受けたこと										
ある	(9.0%)	(13.3%)	(9.9%)	(14.8%)	(8.9%)	(14.8%)	(10.7%)	(14.7%)	(14.7%)	(20.6%)
ない	(91.0%)	(86.7%)	(90.1%)	(85.2%)	(91.1%)	(85.2%)	(89.3%)	(85.3%)	(85.3%)	(79.4%)
受検経験ありのうち_HIV検査場所(これまで)										
保健所・保健センター	(44.7%)	(19.1%)	(59.0%)	(30.4%)	(41.9%)	(19.2%)	(55.9%)	(18.8%)	(58.4%)	(28.0%)
新宿東口検査・相談室 (南新宿検査・相談室)	(3.9%)	(0.9%)	(2.4%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)
入院時や手術前に行う、病院の検査	(25.0%)	(14.5%)	(14.5%)	(12.0%)	(16.2%)	(16.8%)	(10.2%)	(12.9%)	(7.9%)	(9.3%)
手術や入院時以外の病院や診療所の検査	(10.5%)	(7.3%)	(10.8%)	(12.8%)	(14.9%)	(12.8%)	(10.2%)	(5.9%)	(12.4%)	(6.5%)
妊娠時の検査 (妊婦健診)	(2.6%)	(57.3%)	(4.8%)	(44.0%)	(2.7%)	(56.0%)	(0.0%)	(58.8%)	(2.2%)	(57.9%)
イベントHIV検査会	(3.9%)	(1.8%)	(3.6%)	(0.8%)	(2.7%)	(0.0%)	(1.7%)	(4.7%)	(1.1%)	(0.0%)
郵送検査	(10.5%)	(1.8%)	(3.6%)	(4.8%)	(2.7%)	(1.6%)	(1.7%)	(2.4%)	(7.9%)	(1.9%)
個人輸入した、自己判定検査キット	(1.3%)	(0.9%)	(1.2%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(1.1%)	(0.0%)
国立国際医療研究センターのSH外来	(2.6%)	(0.9%)	(2.4%)	(0.8%)	(1.4%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)
職場等の健康診断のオプション	(1.3%)	(3.6%)	(7.2%)	(1.6%)	(4.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(3.5%)	(5.6%)	(1.9%)
献血	(13.2%)	(5.5%)	(6.0%)	(8.0%)	(16.2%)	(6.4%)	(16.9%)	(3.5%)	(12.4%)	(5.6%)
その他	(2.6%)	(1.8%)	(2.4%)	(1.6%)	(2.7%)	(0.8%)	(5.1%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.9%)
受検経験ありのうち_一番最近にHIV検査を受けたとき										
過去6ヵ月以内	(9.2%)	(9.1%)	(8.4%)	(5.6%)	(6.8%)	(4.0%)	(6.8%)	(10.6%)	(6.7%)	(5.6%)
過去1年以内	(5.3%)	(10.9%)	(3.6%)	(8.0%)	(5.4%)	(8.0%)	(6.8%)	(9.4%)	(4.5%)	(9.3%)
過去1年から3年以内	(9.2%)	(13.6%)	(14.5%)	(9.6%)	(10.8%)	(11.2%)	(8.5%)	(9.4%)	(23.6%)	(15.0%)
3年より以前	(76.3%)	(66.4%)	(73.5%)	(76.8%)	(77.0%)	(76.8%)	(78.0%)	(70.6%)	(65.2%)	(70.1%)
受検経験ありのうち_一番最近に受けたHIV検査の種類										
保健所・保健センター	(42.1%)	(14.5%)	(57.8%)	(25.6%)	(37.8%)	(19.2%)	(54.2%)	(15.3%)	(49.4%)	(25.2%)
新宿東口検査・相談室 (南新宿検査・相談室)	(0.0%)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(2.2%)	(0.0%)
入院時や手術前に行う、病院の検査	(22.4%)	(12.7%)	(12.0%)	(11.2%)	(14.9%)	(11.2%)	(10.2%)	(11.8%)	(7.9%)	(6.5%)
(手術や入院時以外の) 病院や診療所の検査	(9.2%)	(6.4%)	(7.2%)	(11.2%)	(14.9%)	(9.6%)	(10.2%)	(3.5%)	(11.2%)	(4.7%)
妊娠時の検査 (妊婦健診)	(2.6%)	(52.7%)	(4.8%)	(38.4%)	(2.7%)	(52.8%)	(0.0%)	(56.5%)	(2.2%)	(55.1%)
イベントHIV検査会	(2.6%)	(1.8%)	(1.2%)	(0.0%)	(2.7%)	(0.0%)	(1.7%)	(3.5%)	(1.1%)	(0.0%)
郵送検査	(6.6%)	(1.8%)	(2.4%)	(4.0%)	(2.7%)	(1.6%)	(1.7%)	(1.2%)	(6.7%)	(0.9%)
個人輸入した、自己判定検査キット	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(1.1%)	(0.0%)
国立国際医療研究センターのSH外来	(1.3%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.7%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.0%)
職場等の健康診断のオプション	(1.3%)	(2.7%)	(6.0%)	(1.6%)	(4.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(3.5%)	(5.6%)	(1.9%)
献血	(9.2%)	(4.5%)	(4.8%)	(4.8%)	(16.2%)	(4.0%)	(15.3%)	(1.2%)	(11.2%)	(4.7%)
その他	(2.6%)	(1.8%)	(2.4%)	(1.6%)	(2.7%)	(0.8%)	(5.1%)	(2.4%)	(0.0%)	(0.9%)
受検経験なしまたは受検が3年以上前の人内_未受検理由										
保健所の検査実施の時間が都合にあわないから	(2.3%)	(0.6%)	(2.1%)	(0.7%)	(1.6%)	(0.4%)	(2.0%)	(0.7%)	(2.6%)	(1.0%)
保健所の場所が遠いから	(1.2%)	(0.5%)	(1.5%)	(0.9%)	(1.1%)	(0.4%)	(1.5%)	(0.4%)	(1.2%)	(1.6%)
知り合いに会うかもしれないから	(0.4%)	(0.3%)	(1.0%)	(1.0%)	(1.1%)	(0.2%)	(0.9%)	(0.2%)	(1.9%)	(0.4%)
検査を受けることを誰かに知られるかもしれないから	(1.4%)	(0.4%)	(0.7%)	(1.1%)	(1.6%)	(0.6%)	(1.1%)	(0.2%)	(1.2%)	(1.0%)
ゲイであると思われそうだから	(0.5%)	(0.0%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.5%)	(0.0%)
セクシュアリティや性行動について話したくないから	(0.7%)	(0.1%)	(1.1%)	(0.5%)	(0.6%)	(0.5%)	(1.1%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.0%)
もし感染していたら、どうしていいかわからないから	(1.7%)	(0.9%)	(1.5%)	(0.4%)	(1.6%)	(2.3%)	(2.0%)	(1.4%)	(2.6%)	(0.8%)
そのうち症状が出るまでと覚悟が来ると思うから	(1.6%)	(1.1%)	(1.7%)	(1.0%)	(1.5%)	(1.3%)	(2.0%)	(2.9%)	(1.9%)	(0.6%)
お金がかかるから	(4.7%)	(3.9%)	(4.7%)	(4.7%)	(5.9%)	(6.4%)	(5.8%)	(4.3%)	(5.6%)	(3.5%)
どこで検査を受けられるかわからないから	(4.7%)	(7.8%)	(5.4%)	(5.6%)	(5.7%)	(5.6%)	(7.2%)	(4.5%)	(6.8%)	(8.0%)
感染している可能性が無いと思うから	(88.8%)	(89.4%)	(87.6%)	(88.5%)	(87.9%)	(86.5%)	(87.0%)	(88.6%)	(84.5%)	(85.7%)
前に受けたから	(1.3%)	(3.0%)	(1.8%)	(4.5%)	(2.3%)	(5.2%)	(3.7%)	(2.9%)	(2.3%)	(4.3%)
その他	(1.7%)	(1.9%)	(1.6%)	(1.2%)	(1.1%)	(2.2%)	(2.2%)	(1.8%)	(2.3%)	(3.5%)

表 5-1. 集団別・地域別の検査に関する態度や経験等

	首都圏:MSM (n=569)	首都圏:男性 (金銭を介した性交あり) (n=899)	首都圏:女性 (金銭を介した性交あり) (n=308)	首都圏:一般男性 (n=925)	首都圏:一般女性 (n=1220)	北海道東北:一般男性 (n=829)	北海道東北:一般女性 (n=866)	関東甲信越(首都圏除):一般男性 (n=388)	関東甲信越(首都圏除):一般女性 (n=399)	北陸:一般男性 (n=835)	北陸:一般女性 (n=824)
Q12_検査をためらった経験											
知人などに会ったり見られたりするかもしれない	(11.1%)	(4.7%)	(5.5%)	(1.9%)	(1.2%)	(3.0%)	(2.1%)	(4.9%)	(3.0%)	(4.2%)	(3.2%)
HIV検査を受けることを、誰かに知られるかもしれない	(10.9%)	(4.3%)	(7.8%)	(2.5%)	(1.6%)	(3.6%)	(2.7%)	(3.4%)	(3.5%)	(4.0%)	(2.8%)
グイであることを、誰かに知られるかもしれない	(12.3%)	(0.4%)	(1.3%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.1%)	(1.3%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)
性風俗産業で働いていることで、何かが言われるかもしれない	(1.4%)	(0.8%)	(4.5%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.5%)	(0.7%)	(1.0%)	(0.5%)	(0.2%)	(0.5%)
自分の性行動について話したくない	(17.4%)	(6.9%)	(9.1%)	(4.4%)	(5.2%)	(7.1%)	(6.5%)	(8.0%)	(5.8%)	(7.2%)	(5.5%)
その他	(0.4%)	(0.1%)	(0.3%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.1%)	(0.1%)
特になし	(68.7%)	(87.1%)	(78.2%)	(92.2%)	(93.4%)	(88.7%)	(90.3%)	(86.9%)	(90.2%)	(87.8%)	(90.8%)
Q13 郵送検査キットがあったら											
HIVの検査を受けようと思う	(29.0%)	(13.5%)	(17.2%)	(5.7%)	(6.3%)	(11.2%)	(6.1%)	(10.6%)	(6.0%)	(9.2%)	(7.4%)
HIV以外の性感染症の検査を受けようと思う	(2.8%)	(1.8%)	(4.2%)	(0.6%)	(1.0%)	(1.4%)	(0.7%)	(2.1%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.8%)
HIVと性感染症の検査を受けようと思う	(25.1%)	(12.9%)	(16.6%)	(8.0%)	(8.5%)	(10.4%)	(9.8%)	(11.3%)	(10.0%)	(10.1%)	(8.3%)
受けようとは思わない	(26.7%)	(49.9%)	(38.3%)	(64.8%)	(56.2%)	(55.5%)	(57.7%)	(53.6%)	(61.2%)	(55.3%)	(57.5%)
わからない	(16.3%)	(21.9%)	(23.7%)	(20.9%)	(28.0%)	(21.5%)	(25.6%)	(22.4%)	(21.8%)	(24.4%)	(26.0%)
Q14 保健所で郵送検査キットを受け取れるとしたら受け取りたいか											
そう思う	(24.1%)	(10.7%)	(14.0%)	(4.1%)	(4.2%)	(9.7%)	(4.5%)	(8.0%)	(4.5%)	(7.1%)	(4.1%)
ややそう思う	(23.4%)	(15.1%)	(15.3%)	(8.0%)	(9.9%)	(11.8%)	(10.3%)	(11.6%)	(8.8%)	(12.7%)	(10.2%)
あまりそう思わない	(16.2%)	(16.1%)	(17.5%)	(16.1%)	(15.4%)	(16.6%)	(17.6%)	(14.4%)	(16.3%)	(13.8%)	(17.1%)
そう思わない	(20.6%)	(37.3%)	(30.8%)	(46.8%)	(43.2%)	(41.1%)	(43.3%)	(43.8%)	(44.6%)	(42.4%)	(43.2%)
わからない	(15.8%)	(20.8%)	(22.4%)	(25.0%)	(27.3%)	(20.7%)	(24.4%)	(22.2%)	(25.8%)	(24.1%)	(25.4%)
Q16 保健所や病院へ行くと知り合いに会う可能性											
そう思う	(28.3%)	(16.6%)	(24.7%)	(13.9%)	(22.5%)	(30.2%)	(38.2%)	(28.9%)	(37.1%)	(28.5%)	(37.3%)
そう思わない	(45.5%)	(52.9%)	(52.3%)	(51.5%)	(44.3%)	(40.0%)	(33.1%)	(37.9%)	(30.3%)	(38.8%)	(29.0%)
わからない	(26.2%)	(30.5%)	(23.1%)	(34.6%)	(33.3%)	(29.8%)	(28.6%)	(33.2%)	(32.6%)	(32.7%)	(33.7%)
Q17_小中高での学習経験											
「男は男らしく」「女は女らしく」と教えられたこと	(32.3%)	(27.5%)	(25.0%)	(20.2%)	(16.4%)	(21.6%)	(18.5%)	(23.7%)	(20.3%)	(24.1%)	(16.0%)
男女間のエイズ予防に関すること	(22.1%)	(14.9%)	(32.5%)	(12.6%)	(22.9%)	(14.5%)	(25.8%)	(17.3%)	(27.3%)	(15.2%)	(26.0%)
男性同性間のエイズ予防に関すること	(11.2%)	(6.7%)	(11.7%)	(5.1%)	(5.7%)	(4.9%)	(7.9%)	(7.5%)	(8.0%)	(6.9%)	(8.3%)
薬物使用に関すること	(27.8%)	(19.0%)	(31.8%)	(14.2%)	(30.9%)	(17.4%)	(30.4%)	(17.8%)	(35.8%)	(17.5%)	(33.0%)
いずれもない、覚えていない	(47.3%)	(57.3%)	(42.5%)	(65.9%)	(53.3%)	(63.4%)	(53.3%)	(59.0%)	(48.4%)	(58.9%)	(51.0%)
Q18_小中高での経験											
いじめ被害にあったこと	(44.3%)	(25.4%)	(54.9%)	(20.6%)	(30.1%)	(27.0%)	(34.2%)	(25.5%)	(34.3%)	(24.3%)	(36.0%)
不登校になったこと	(11.6%)	(5.0%)	(20.1%)	(4.5%)	(6.2%)	(5.1%)	(9.2%)	(5.9%)	(9.3%)	(3.6%)	(8.0%)
いずれもない、覚えていない	(52.7%)	(72.3%)	(38.6%)	(76.9%)	(68.0%)	(70.8%)	(62.4%)	(72.2%)	(62.7%)	(74.4%)	(60.0%)
Q19_自傷経験											
刃物でわざと自分の身体を傷つけたこと	(8.3%)	(3.1%)	(25.3%)	(1.8%)	(7.2%)	(2.7%)	(8.4%)	(3.4%)	(10.5%)	(2.2%)	(8.5%)
自殺を考えたこと	(30.1%)	(18.8%)	(53.9%)	(13.4%)	(23.4%)	(18.7%)	(27.3%)	(22.9%)	(28.8%)	(15.3%)	(26.3%)
自殺未遂をしたこと	(10.2%)	(3.0%)	(18.2%)	(2.2%)	(4.5%)	(2.8%)	(6.4%)	(3.6%)	(6.5%)	(2.8%)	(5.8%)
いずれもない、覚えていない	(63.8%)	(79.5%)	(38.6%)	(85.2%)	(74.2%)	(79.7%)	(69.1%)	(75.5%)	(67.9%)	(83.0%)	(69.8%)
ヘルスリテラシー(CCHL)3区分											
低群(5-15)	(33.0%)	(39.7%)	(35.7%)	(44.9%)	(34.4%)	(42.6%)	(39.6%)	(46.6%)	(36.6%)	(43.5%)	(41.5%)
中群(16-19)	(32.0%)	(29.7%)	(29.2%)	(27.0%)	(34.3%)	(28.8%)	(35.3%)	(28.9%)	(33.3%)	(29.9%)	(36.2%)
高群(20-25)	(35.0%)	(30.6%)	(35.1%)	(28.1%)	(31.2%)	(28.6%)	(25.1%)	(24.5%)	(30.1%)	(26.6%)	(22.3%)

表 5-2. 集団別,地域別の検査に関する態度や経験等 (つづき)

	東海:一般男 性 (n=848)	東海:一般女 性 (n=830)	近畿:一般男 性 (n=835)	近畿:一般女 性 (n=846)	中国四国:一 般男性 (n=829)	中国四国:一 般女性 (n=844)	九州:一般男 性 (n=551)	九州:一般女 性 (n=578)	沖縄:一般男 性 (n=606)	沖縄:一般女 性 (n=520)
Q12_検査をためらった経験										
知人などに会ったが見られたかもしれない	(3.9%)	(1.8%)	(3.7%)	(2.6%)	(3.5%)	(2.5%)	(2.2%)	(2.4%)	(4.6%)	(2.7%)
HIV検査を受けることを、誰かに知られるかもしれない	(4.4%)	(1.8%)	(3.4%)	(2.1%)	(4.9%)	(2.0%)	(4.0%)	(3.1%)	(4.6%)	(2.3%)
ゲイであることを、誰かに知られるかもしれない	(0.6%)	(0.2%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.4%)
性風俗産業で働いていることで、何か言われるかもしれない	(0.5%)	(0.5%)	(0.6%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.4%)	(0.7%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.2%)
自分の性行動について話したくない	(6.1%)	(5.2%)	(7.4%)	(4.5%)	(7.2%)	(8.4%)	(6.5%)	(4.5%)	(6.4%)	(5.8%)
その他	(0.2%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.4%)
特になし	(89.0%)	(92.3%)	(88.9%)	(92.6%)	(88.1%)	(88.5%)	(89.5%)	(92.6%)	(88.6%)	(90.8%)
Q13 郵送検査キットがあったら										
HIVの検査を受けようと思う	(8.3%)	(6.3%)	(10.9%)	(7.6%)	(9.9%)	(8.6%)	(11.4%)	(10.7%)	(15.8%)	(11.0%)
HIV以外の性感染症の検査を受けようと思う	(1.1%)	(1.8%)	(1.1%)	(0.9%)	(1.0%)	(1.4%)	(0.9%)	(1.7%)	(1.3%)	(1.2%)
HIVと性感染症の検査を受けようと思う	(10.3%)	(8.4%)	(8.3%)	(7.7%)	(8.2%)	(9.0%)	(11.6%)	(7.1%)	(12.9%)	(15.0%)
受けようとは思わない	(57.1%)	(59.2%)	(59.9%)	(58.7%)	(58.7%)	(56.0%)	(56.3%)	(55.0%)	(48.7%)	(48.1%)
わからない	(23.3%)	(24.3%)	(19.9%)	(25.1%)	(22.2%)	(24.9%)	(19.8%)	(25.4%)	(21.3%)	(24.8%)
Q14 保健所で郵送検査キットを受け取れるとしたら受け取りたいか										
そう思う	(8.1%)	(4.0%)	(10.7%)	(5.8%)	(6.8%)	(4.6%)	(9.3%)	(5.7%)	(12.7%)	(7.7%)
ややそう思う	(12.5%)	(9.2%)	(10.1%)	(8.0%)	(11.3%)	(9.2%)	(14.0%)	(9.2%)	(14.7%)	(11.5%)
あまりそう思わない	(14.6%)	(16.9%)	(16.0%)	(14.8%)	(16.6%)	(17.4%)	(16.2%)	(16.1%)	(17.2%)	(21.2%)
そう思わない	(40.9%)	(44.3%)	(41.8%)	(46.3%)	(41.6%)	(43.4%)	(38.8%)	(44.5%)	(36.3%)	(36.7%)
わからない	(23.8%)	(25.7%)	(21.4%)	(25.1%)	(23.6%)	(25.4%)	(21.8%)	(24.6%)	(19.1%)	(22.9%)
Q16 保健所や病院へ行くと知り合いに会う可能性										
そう思う	(22.5%)	(32.7%)	(22.8%)	(30.0%)	(31.8%)	(35.4%)	(32.3%)	(32.7%)	(33.3%)	(38.7%)
そう思わない	(40.9%)	(34.8%)	(44.2%)	(36.8%)	(35.5%)	(32.8%)	(39.9%)	(32.7%)	(36.5%)	(31.2%)
わからない	(36.6%)	(32.5%)	(33.1%)	(33.2%)	(32.7%)	(31.8%)	(27.8%)	(34.6%)	(30.2%)	(30.2%)
Q17_小中高での学習経験										
「男は男らしく」「女は女らしく」と教えられたこと	(24.3%)	(15.5%)	(24.4%)	(18.6%)	(24.4%)	(20.9%)	(24.1%)	(19.9%)	(26.6%)	(18.8%)
男女間のエイズ予防に関すること	(16.3%)	(24.2%)	(15.9%)	(25.1%)	(21.2%)	(29.3%)	(20.7%)	(30.8%)	(24.9%)	(36.3%)
男性同性間のエイズ予防に関すること	(7.0%)	(6.4%)	(6.3%)	(8.3%)	(8.8%)	(8.9%)	(8.5%)	(7.8%)	(9.6%)	(10.2%)
薬物使用に関すること	(21.2%)	(33.9%)	(15.2%)	(28.0%)	(22.4%)	(31.6%)	(20.1%)	(36.2%)	(25.9%)	(36.2%)
いずれもない,覚えていない	(55.3%)	(52.7%)	(61.4%)	(53.1%)	(53.4%)	(49.4%)	(53.2%)	(47.2%)	(50.2%)	(44.8%)
Q18_小中高での経験										
いじめ被害にあったこと	(24.5%)	(32.3%)	(22.3%)	(28.3%)	(21.4%)	(28.2%)	(24.5%)	(30.3%)	(26.4%)	(30.8%)
不登校になったこと	(4.2%)	(6.0%)	(5.1%)	(7.6%)	(3.1%)	(7.5%)	(6.5%)	(8.1%)	(6.4%)	(8.3%)
いずれもない,覚えていない	(73.8%)	(65.4%)	(75.6%)	(68.4%)	(77.2%)	(68.6%)	(72.2%)	(67.5%)	(70.3%)	(66.2%)
Q19_自傷経験										
刃物でわざと自分の身体を傷つけたこと	(2.1%)	(5.3%)	(3.5%)	(8.5%)	(2.7%)	(8.3%)	(2.4%)	(8.1%)	(2.6%)	(8.5%)
自殺を考えたこと	(18.9%)	(21.0%)	(16.4%)	(23.5%)	(15.2%)	(25.7%)	(19.2%)	(24.4%)	(21.6%)	(25.2%)
自殺未遂をしたこと	(2.9%)	(5.1%)	(2.9%)	(5.1%)	(2.5%)	(4.9%)	(1.8%)	(3.6%)	(2.5%)	(5.4%)
いずれもない,覚えていない	(80.0%)	(76.1%)	(81.9%)	(74.1%)	(83.6%)	(71.2%)	(79.3%)	(73.2%)	(76.9%)	(71.9%)
ヘルスリテラシー(CCHL)3区分										
低群(5-15)	(45.0%)	(39.5%)	(42.2%)	(39.1%)	(45.7%)	(37.1%)	(41.2%)	(35.5%)	(35.5%)	(32.9%)
中群(16-19)	(31.1%)	(33.4%)	(29.5%)	(34.5%)	(28.0%)	(35.1%)	(27.6%)	(36.7%)	(33.5%)	(35.8%)
高群(20-25)	(23.8%)	(27.1%)	(28.4%)	(26.4%)	(26.3%)	(27.8%)	(31.2%)	(27.9%)	(31.0%)	(31.3%)

表 6-1. 集団別,地域別の HIV 予防行動

	首都圏:MSM (n=569)	首都圏:男 性(金銭を 介した性交 あり) (n=899)	首都圏:女 性(金銭を 介した性交 あり) (n=308)	首都圏:一 般男性 (n=925)	首都圏:一 般女性 (n=1220)	北海道東 北:一般男 性 (n=829)	北海道東 北:一般女 性 (n=866)	関東甲信越 (首都圏除): 一般男性 (n=388)	関東甲信越 (首都圏除): 一般女性 (n=399)	北陸:一般 男性 (n=835)	北陸:一般女 性 (n=824)
Q20 過去6か月間性交渉人数											
0人(過去6か月間にはしていない)	(34.8%)	(45.7%)	(43.2%)	(57.6%)	(56.2%)	(49.5%)	(50.9%)	(47.9%)	(50.1%)	(50.7%)	(49.4%)
1人	(25.7%)	(30.0%)	(34.4%)	(29.2%)	(33.1%)	(34.0%)	(38.3%)	(35.1%)	(38.3%)	(34.3%)	(39.3%)
2から9人	(30.4%)	(18.8%)	(14.9%)	(9.9%)	(8.2%)	(13.6%)	(8.8%)	(13.4%)	(8.0%)	(11.9%)	(9.3%)
10人から49人	(6.3%)	(3.9%)	(4.9%)	(2.8%)	(2.3%)	(2.7%)	(1.6%)	(2.3%)	(2.8%)	(2.4%)	(1.5%)
50人以上	(2.8%)	(1.6%)	(2.6%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.3%)	(1.3%)	(0.8%)	(0.8%)	(0.5%)
過去6か月間性交渉ありのうち_コンドーム使用有無											
必ず毎回使った	(22.1%)	(35.5%)	(24.6%)	(36.7%)	(32.0%)	(30.1%)	(22.8%)	(29.7%)	(25.1%)	(30.1%)	(28.5%)
使うことの方が多かった	(20.8%)	(14.8%)	(18.9%)	(12.5%)	(14.8%)	(16.2%)	(13.9%)	(22.3%)	(15.6%)	(17.0%)	(13.4%)
たまに使った	(18.1%)	(11.5%)	(17.7%)	(13.3%)	(8.4%)	(10.5%)	(12.9%)	(6.4%)	(15.6%)	(10.0%)	(9.8%)
全に使わなかった	(39.1%)	(38.3%)	(38.9%)	(37.5%)	(44.8%)	(43.2%)	(50.4%)	(41.6%)	(43.7%)	(43.0%)	(48.2%)
Q22 「U=U」言葉を聞いたことがありますか											
聞いたことがない	(68.5%)	(89.2%)	(84.7%)	(91.7%)	(92.6%)	(87.6%)	(91.8%)	(91.8%)	(90.7%)	(91.3%)	(91.6%)
聞いたことはあるが、意味はよく知らない	(15.1%)	(6.5%)	(9.1%)	(6.2%)	(5.1%)	(8.4%)	(5.7%)	(5.2%)	(6.3%)	(5.9%)	(6.1%)
聞いたことがあり、意味も知っている	(16.3%)	(4.3%)	(6.2%)	(2.2%)	(2.3%)	(4.0%)	(2.5%)	(3.1%)	(3.0%)	(2.9%)	(2.3%)
Q23 「PrEP (プレップ)」を聞いたことがありますか											
聞いたことがない	(55.5%)	(91.3%)	(87.7%)	(93.9%)	(94.4%)	(92.2%)	(94.1%)	(94.1%)	(95.5%)	(93.7%)	(94.9%)
聞いたことはあるが、意味はよく知らない	(17.0%)	(5.5%)	(8.4%)	(3.4%)	(3.9%)	(5.4%)	(4.4%)	(3.4%)	(2.8%)	(4.3%)	(3.4%)
聞いたことがあり、意味もわかる	(27.4%)	(3.2%)	(3.9%)	(2.7%)	(1.6%)	(2.4%)	(1.5%)	(2.6%)	(1.8%)	(2.0%)	(1.7%)
Q24 PrEPを利用											
利用したことがない	(80.8%)	(65.5%)	(50.0%)	(76.0%)	(70.0%)	(90.0%)	(76.9%)	(60.0%)	(85.7%)	(82.4%)	(71.4%)
過去に利用したことがある	(5.1%)	(3.4%)	(8.3%)	(0.0%)	(5.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
個人輸入し、デリリーで利用している	(1.9%)	(3.4%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
個人輸入し、オンデマンドで利用している	(4.5%)	(3.4%)	(0.0%)	(4.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
クリニックで購入し、デリリーで利用している	(1.9%)	(6.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
クリニックで購入し、オンデマンドで利用している	(3.8%)	(0.0%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
知人からもらって利用している	(0.0%)	(6.9%)	(16.7%)	(12.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(7.7%)	(10.0%)	(14.3%)	(11.8%)	(28.6%)
その他	(1.9%)	(10.3%)	(8.3%)	(8.0%)	(10.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(5.9%)	(0.0%)
過去6か月間性交渉ありのうち_過去6ヶ月のSTI予防行動											
コンドームを使う	(47.7%)	(48.4%)	(40.6%)	(38.3%)	(37.8%)	(41.1%)	(31.3%)	(41.6%)	(39.2%)	(39.8%)	(35.3%)
PrEP (プレップ)を使う	(4.9%)	(0.8%)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
アナルセックスをしない	(24.8%)	(18.6%)	(17.7%)	(13.8%)	(10.7%)	(15.0%)	(14.1%)	(14.4%)	(11.1%)	(19.2%)	(11.3%)
中出しをしない又はさせない	(24.3%)	(16.2%)	(21.7%)	(10.7%)	(18.0%)	(13.8%)	(16.9%)	(12.4%)	(17.6%)	(14.6%)	(13.9%)
検査を受ける	(9.2%)	(4.9%)	(12.0%)	(1.8%)	(1.3%)	(1.7%)	(2.8%)	(2.0%)	(0.0%)	(3.4%)	(2.6%)
セックスの相手に検査経験と結果を聞く	(6.7%)	(2.0%)	(6.3%)	(1.0%)	(1.7%)	(2.1%)	(3.5%)	(1.5%)	(3.5%)	(1.7%)	(1.7%)
セックスの相手にHIV治療の状況を聴く	(4.0%)	(2.0%)	(4.0%)	(1.3%)	(0.9%)	(1.9%)	(1.4%)	(1.5%)	(1.5%)	(0.7%)	(1.4%)
特にない	(31.5%)	(38.1%)	(38.3%)	(50.0%)	(52.2%)	(47.5%)	(56.0%)	(49.0%)	(52.3%)	(48.5%)	(53.5%)
Q26_PrEP利用課題											
正しい使い方がわからない	(13.5%)	(17.2%)	(0.0%)	(8.0%)	(10.0%)	(20.0%)	(7.7%)	(40.0%)	(28.6%)	(0.0%)	(21.4%)
自分が使うべきかわからない	(16.0%)	(13.8%)	(8.3%)	(4.0%)	(10.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(10.0%)	(28.6%)	(0.0%)	(7.1%)
情報が無い	(14.7%)	(13.8%)	(16.7%)	(4.0%)	(25.0%)	(15.0%)	(0.0%)	(30.0%)	(14.3%)	(29.4%)	(7.1%)
HIVや性感染症の検査を手軽に受けられるとよい	(14.7%)	(17.2%)	(16.7%)	(4.0%)	(0.0%)	(5.0%)	(15.4%)	(10.0%)	(14.3%)	(5.9%)	(0.0%)
腎機能など副作用の検査を手軽に受けられるとよい	(22.4%)	(10.3%)	(8.3%)	(8.0%)	(0.0%)	(5.0%)	(30.8%)	(10.0%)	(28.6%)	(0.0%)	(0.0%)
価格が高くなっている	(37.8%)	(20.7%)	(8.3%)	(8.0%)	(5.0%)	(25.0%)	(30.8%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
薬の入手が困難	(26.9%)	(17.2%)	(8.3%)	(8.0%)	(15.0%)	(15.0%)	(30.8%)	(10.0%)	(14.3%)	(11.8%)	(0.0%)
利用しようとは思わない	(14.1%)	(10.3%)	(16.7%)	(4.0%)	(15.0%)	(20.0%)	(23.1%)	(10.0%)	(14.3%)	(17.6%)	(21.4%)
その他	(3.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(4.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
特に課題はない	(19.2%)	(51.7%)	(41.7%)	(72.0%)	(40.0%)	(45.0%)	(30.8%)	(40.0%)	(42.9%)	(41.2%)	(57.1%)
Q27 出会い系アプリで性交渉											
ない	(47.8%)	(74.1%)	(51.3%)	(90.1%)	(87.2%)	(80.7%)	(84.9%)	(80.4%)	(82.7%)	(82.3%)	(84.5%)
ある	(52.2%)	(25.9%)	(48.7%)	(9.9%)	(12.8%)	(19.3%)	(15.1%)	(19.6%)	(17.3%)	(17.7%)	(15.5%)
Q28 6か月以内HIV検査受けたか											
はい	(8.8%)	(1.9%)	(5.5%)	(0.6%)	(1.0%)	(0.7%)	(1.3%)	(1.0%)	(0.8%)	(0.7%)	(0.5%)
いいえ	(91.2%)	(98.1%)	(94.5%)	(99.4%)	(99.0%)	(99.3%)	(98.7%)	(99.0%)	(99.2%)	(99.3%)	(99.5%)

表 6-2. 集団別,地域別の HIV 予防行動 (つづき)

	東海:一般男 性 (n=848)	東海:一般女 性 (n=830)	近畿:一般男 性 (n=835)	近畿:一般女 性 (n=846)	中国四国:一 般男性 (n=829)	中国四国:一 般女性 (n=844)	九州:一般男 性 (n=551)	九州:一般女 性 (n=578)	沖縄:一般男 性 (n=606)	沖縄:一般女 性 (n=520)
Q20 過去6か月間性交渉人数										
0人 (過去6か月間にはしていない)	(55.0%)	(54.0%)	(49.6%)	(51.3%)	(49.2%)	(47.4%)	(45.2%)	(45.5%)	(41.9%)	(43.5%)
1人	(31.5%)	(35.9%)	(29.8%)	(36.6%)	(34.1%)	(42.3%)	(37.4%)	(42.7%)	(39.4%)	(46.0%)
2から9人	(10.3%)	(8.3%)	(15.8%)	(9.3%)	(12.4%)	(7.8%)	(13.2%)	(9.9%)	(14.0%)	(7.9%)
10人から49人	(2.5%)	(1.6%)	(3.6%)	(2.1%)	(3.1%)	(2.0%)	(3.4%)	(1.7%)	(3.5%)	(2.5%)
50人以上	(0.8%)	(0.2%)	(1.2%)	(0.6%)	(1.1%)	(0.5%)	(0.7%)	(0.2%)	(1.2%)	(0.2%)
過去6か月間性交渉ありのうち、コンドーム使用有無										
必ず毎回使った	(34.6%)	(24.3%)	(31.6%)	(27.7%)	(33.3%)	(27.0%)	(24.5%)	(24.4%)	(27.0%)	(22.8%)
使うことの方が多かった	(15.7%)	(17.3%)	(14.5%)	(12.9%)	(16.9%)	(14.0%)	(16.2%)	(14.6%)	(13.9%)	(12.9%)
たまに使った	(12.0%)	(12.6%)	(13.1%)	(12.1%)	(9.0%)	(9.9%)	(12.9%)	(13.3%)	(11.9%)	(11.9%)
全く使わなかった	(37.7%)	(45.8%)	(40.9%)	(47.3%)	(40.9%)	(49.1%)	(46.4%)	(47.6%)	(47.2%)	(52.4%)
Q22 「U=U」言葉を聞いたことがありますか										
聞いたことがない	(90.6%)	(93.9%)	(88.5%)	(91.4%)	(88.3%)	(91.4%)	(89.1%)	(92.4%)	(88.1%)	(94.4%)
聞いたことはあるが、意味はよく知らない	(5.7%)	(4.5%)	(6.6%)	(5.6%)	(7.7%)	(6.3%)	(7.6%)	(5.4%)	(7.3%)	(3.3%)
聞いたことがあり、意味も知っている	(3.8%)	(1.7%)	(4.9%)	(3.1%)	(4.0%)	(2.4%)	(3.3%)	(2.2%)	(4.6%)	(2.3%)
Q23 「PrEP (プレップ)」を聞いたことがありますか										
聞いたことがない	(92.7%)	(95.7%)	(92.0%)	(93.7%)	(91.4%)	(94.4%)	(92.6%)	(94.1%)	(92.4%)	(96.2%)
聞いたことはあるが、意味はよく知らない	(4.8%)	(3.3%)	(6.0%)	(4.1%)	(6.3%)	(3.9%)	(4.7%)	(5.0%)	(4.0%)	(2.9%)
聞いたことがあり、意味もわかる	(2.5%)	(1.1%)	(2.0%)	(2.1%)	(2.3%)	(1.7%)	(2.7%)	(0.9%)	(3.6%)	(1.0%)
Q24 PrEPを利用										
利用したことがない	(81.0%)	(77.8%)	(64.7%)	(77.8%)	(63.2%)	(78.6%)	(80.0%)	(40.0%)	(86.4%)	(80.0%)
過去に利用したことがある	(4.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
個人輸入し、デイルーで利用している	(4.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(9.1%)	(0.0%)
個人輸入し、オンデマンドで利用している	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
クリニックで購入し、デイルーで利用している	(4.8%)	(11.1%)	(5.9%)	(0.0%)	(5.3%)	(14.3%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)
クリニックで購入し、オンデマンドで利用している	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
知人からもらって利用している	(0.0%)	(0.0%)	(23.5%)	(11.1%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)
その他	(4.8%)	(11.1%)	(5.9%)	(11.1%)	(21.1%)	(7.1%)	(13.3%)	(0.0%)	(4.5%)	(20.0%)
過去6か月間性交渉ありのうち、過去6ヶ月のSTI予防行動										
コンドームを使う	(46.1%)	(34.3%)	(41.6%)	(35.7%)	(42.5%)	(36.3%)	(38.7%)	(36.5%)	(38.4%)	(33.3%)
PrEP (プレップ) を使う	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)
アナルセックスをしない	(15.4%)	(10.5%)	(15.2%)	(11.9%)	(13.8%)	(12.4%)	(15.6%)	(13.0%)	(14.8%)	(11.9%)
中出しをしない又はさせない	(13.6%)	(16.8%)	(12.8%)	(17.5%)	(11.9%)	(17.6%)	(12.9%)	(15.2%)	(13.4%)	(15.0%)
検査を受ける	(2.1%)	(1.8%)	(4.3%)	(1.7%)	(1.4%)	(2.9%)	(2.3%)	(3.8%)	(1.4%)	(4.8%)
セックスの相手に検査経験と結果を聞く	(1.8%)	(2.1%)	(2.4%)	(0.5%)	(0.5%)	(2.0%)	(2.0%)	(3.5%)	(1.4%)	(3.4%)
セックスの相手にHIV治療の状況を尋ねる	(2.1%)	(1.6%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.7%)	(1.8%)	(2.0%)	(2.2%)	(0.9%)	(1.7%)
特になし	(42.4%)	(53.9%)	(46.8%)	(52.7%)	(46.6%)	(51.8%)	(48.7%)	(54.0%)	(50.9%)	(55.8%)
Q26 PrEP利用課題										
正しい使い方がわからない	(23.8%)	(0.0%)	(11.8%)	(27.8%)	(5.3%)	(7.1%)	(13.3%)	(40.0%)	(13.6%)	(20.0%)
自分が使うべきかわからない	(4.8%)	(11.1%)	(23.5%)	(16.7%)	(10.5%)	(14.3%)	(13.3%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)
情報が無い	(33.3%)	(11.1%)	(5.9%)	(11.1%)	(0.0%)	(7.1%)	(26.7%)	(20.0%)	(36.4%)	(0.0%)
HIVや性感染症の検査を手軽に受けられるとよい	(4.8%)	(33.3%)	(0.0%)	(5.6%)	(10.5%)	(0.0%)	(6.7%)	(40.0%)	(9.1%)	(0.0%)
腎機能など副作用の検査を手軽に受けられるとよい	(4.8%)	(11.1%)	(11.8%)	(5.6%)	(10.5%)	(7.1%)	(13.3%)	(40.0%)	(18.2%)	(0.0%)
価格が高くなっている	(4.8%)	(11.1%)	(17.6%)	(11.1%)	(26.3%)	(7.1%)	(20.0%)	(0.0%)	(31.8%)	(20.0%)
薬の入手が困難	(4.8%)	(0.0%)	(11.8%)	(11.1%)	(26.3%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(13.6%)	(20.0%)
利用しようとは思わない	(4.8%)	(44.4%)	(5.9%)	(11.1%)	(15.8%)	(28.6%)	(6.7%)	(0.0%)	(13.6%)	(60.0%)
その他	(4.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.6%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
特に課題はない	(33.3%)	(22.2%)	(41.2%)	(33.3%)	(36.8%)	(42.9%)	(46.7%)	(40.0%)	(27.3%)	(20.0%)
Q27 出会い系アプリで性交渉										
ない	(79.7%)	(85.8%)	(80.6%)	(84.5%)	(80.3%)	(83.6%)	(79.3%)	(83.2%)	(77.4%)	(84.2%)
ある	(20.3%)	(14.2%)	(19.4%)	(15.5%)	(19.7%)	(16.4%)	(20.7%)	(16.8%)	(22.6%)	(15.8%)
Q28 6か月以内HIV検査受けたか										
はい	(0.8%)	(1.2%)	(0.8%)	(0.8%)	(0.6%)	(0.6%)	(0.7%)	(1.6%)	(1.0%)	(1.2%)
いいえ	(99.2%)	(98.8%)	(99.2%)	(99.2%)	(99.4%)	(99.4%)	(99.3%)	(98.4%)	(99.0%)	(98.8%)

参考2021年度

	MSM (n=1530)	非MSM男性 (n=746)	女性 (n=751)
これまでのHIV検査受検経験			
1回だけある	15.9%	8.8%	8.8%
2回から5回ある	13.5%	2.7%	3.2%
6回以上ある	5.6%	0.5%	0.4%
ある計（再掲）	34.9%	12.1%	12.4%
ない	65.1%	87.9%	87.6%
直近のHIV検査受期			
過去6カ月以内	18.2%	7.8%	6.5%
過去1年以内	12.0%	7.8%	15.1%
過去1年から3年以内	20.2%	15.6%	18.3%
3年より以前	49.6%	68.9%	60.2%
直近のHIV検査受検場所			
保健所・保健センター	32.6%	37.8%	24.7%
SH外来（国立国際医療センター）	3.0%	0.0%	1.1%
手術前や入院時の病院、診療所	13.7%	18.9%	20.4%
（手術前や入院時以外の）病院等	17.8%	23.3%	23.7%
南新宿検査・相談室	9.4%	3.3%	1.1%
新宿東口検査・相談室	4.7%	2.2%	1.1%
イベントHIV検査会	2.4%	1.1%	2.2%
献血	5.2%	3.3%	10.8%
HIV check.jp	1.1%	0.0%	0.0%
HIVcheckjp以外の郵送検査	2.6%	2.2%	1.1%