

発災数週間の環境改善は脳卒中予防のポイントではないか




Table 1 熊本地震被災者（阿蘇地区）と一般住民（福井県敦賀市）のDVT検出率と背景因子の比較

	発災12-19日 n = 207	一般住民 (福井県敦賀市) n = 81	p value
年齢 (歳)	68.2 ± 16.1	69.4 ± 8.0	n.s
性別 (男/女)	48 / 159	24 / 57	n.s
血圧			
収縮期血圧 (mmHg)	132.7 ± 19.0	135.8 ± 19.2	n.s
拡張期血圧 (mmHg)	78.2 ± 13.4	78.4 ± 12.5	n.s
生活習慣			
喫煙 n (%)	20 (9.7)	4 (4.9)	n.s
飲酒 n (%)	46 (22.2)	21 (25.9)	n.s
睡眠薬服薬 n (%)	40 (19.3)	13 (16.0)	n.s
不眠 n (%)	107 (51.7)	23 (28.4)	p < 0.001
行動			
床やベッド等からの起立困難 n (%)	57 (27.5)	7 (8.6)	p < 0.001
臥床時間増加 n (%)	74 (35.7)	9 (11.1)	p < 0.001
歩行時間短縮 n (%)	93 (44.9)	32 (39.5)	n.s
脱水症状 n (%)	46 (22.2)	6 (7.4)	p < 0.01
車中泊 n (%)	123 (59.4)	6 (7.4)	p < 0.001
基礎疾患			
心疾患 n (%)	41 (19.8)	20 (24.7)	n.s
糖尿病 n (%)	28 (13.5)	9 (11.1)	n.s
高血圧 n (%)	100 (48.3)	33 (40.7)	n.s
脂質異常症 n (%)	58 (28.0)	37 (45.7)	p < 0.01
悪性腫瘍 n (%)	18 (8.7)	12 (14.8)	n.s
下肢静脈超音波検査			
深部静脈血栓症 n (%)	23 (11.1)	2 (2.5)	p < 0.05
もやもやエコー n (%)	71 (34.3)	37 (45.7)	n.s
静脈拡張 n (%)	78 (37.7)	31 (38.3)	n.s
静脈拡張 (mm)	7.0 ± 2.3	7.5 ± 1.9	n.s

平均値 ± 標準偏差, ns: 非有意差, Mann-Whitney U 検定, χ^2 検定



福祉避難所内のトイレ (能登町)



トイレトレーラー (七尾市)



セントラルキッチンでの炊き出しの様子



避難所外自衛隊風呂 (能登町)



ランドリーカー (輪島市)



ダンボールベッド



テント



キッチンカー

木戸口周平、大西秀典、橋本洋一郎、甲斐豊、山村修ほか, 医学検査 73(4) 667-673, 2024


保健医療福祉調整本部による支援統制：『裁量権の地方移譲』

保健医療福祉調整本部等におけるマネジメントの進め方 2025より

市町村レベル

2次医療圏レベル

都道府県レベル
(政令指定都市を含む)



厚労省 健康安全・危機管理対策総合研究事業 保健医療福祉調整本部等におけるマネジメントの進め方 2025 令和7年3月

3 災害医療提供体制図

